

**INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH
TEKTUROWE PUDEŁKO**

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Paracetamol Pure Medic

500 mg, tabletki

Paracetamolum

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

Jedna tabletki zawiera 500 mg paracetamolu

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

oraz substancje pomocnicze. Dodatkowe informacje - patrz ulotka.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

tabletki

10 tabletek numer GTIN 5908288965637

12 tabletek numer GTIN 5908288965644

20 tabletek numer GTIN 5908288965095

24 tabletki numer GTIN 5908288965101

30 tabletek numer GTIN 5908288965651

36 tabletek numer GTIN 5908288965668

48 tabletek numer GTIN 5908288965675

50 tabletek numer GTIN 5908288965118

60 tabletek numer GTIN 5908288965125

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

**6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU
LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA
DZIECI**

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności (EXP):

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Pure Medic Sp. z o.o.
ul. Zbąszyńska 3
91-342 Łódź

[logo podmiotu odpowiedzialnego]

12. NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr

13. NUMER SERII

Nr serii (Lot):

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC - Lek wydawany bez recepty.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy.

Lek zawiera paracetamol.

Nie należy stosować dawki większej niż zalecana. W razie zastosowania dawki większej niż zalecana natychmiast skontaktować się z lekarzem, nawet jeśli nie wystąpiły żadne objawy, ponieważ może dojść do zagrażającego życiu uszkodzenia wątroby.

Nie stosować jednocześnie innych leków zawierających paracetamol.

Wskazania:

Lek jest stosowany w objawowym leczeniu łagodnego do umiarkowanego bólu różnego pochodzenia (ból głowy, w tym napięciowe bóle głowy, ból gardła, ból zębów, ból kostne, stawowe i mięśniowe, bolesne miesiączkowanie) oraz gorączki np. w przebiegu przeziębienia.

Dawkowanie:

Dorośli, w tym osoby w podeszłym wieku i młodzież w wieku powyżej 12 lat (o masie ciała powyżej 50 kg):

Zalecana dawka jednorazowa to 1 do 2 tabletek, w razie konieczności dawkę można powtarzać nie częściej niż co 4 godziny, do 4 razy na dobę. Nie należy stosować więcej niż 8 tabletek na dobę.

Dorośli, w tym osoby w podeszłym wieku i młodzież w wieku powyżej 12 lat (o masie ciała 40 - 50 kg):

Zalecana dawka jednorazowa to 1 tabletkę, w razie konieczności dawkę można powtarzać nie częściej niż co 4 godziny, do 6 razy na dobę. Nie należy stosować więcej niż 6 tabletek na dobę.

Bez konsultacji z lekarzem leku nie należy stosować dłużej niż przez 3 dni.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE'A

paracetamol pure medic 500 mg tabletki

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

nie dotyczy

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

nie dotyczy

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH

BLISTER

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Paracetamol Pure Medic

500 mg

tabletki

Paracetamolum

2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

3. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP:

4. NUMER SERII

Lot:

5. INNE