

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

PUDEŁKO TEKTUROWE

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Travisto RefluControl

20 mg + 165 mg + 800 mg, tabletki do rozgryzania i żucia

Famotidinum + Magnesii hydroxidum + Calcii carbonas

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

Skład: Każda tabletki zawiera 20 mg famotydyny, 165 mg magnezu wodorotlenku, 800 mg wapnia węglanu

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

oraz substancje pomocnicze, w tym glukozę (jako składnik dekstratów i maltodekstryny wchodzącej w skład aromatu miętowego) – dodatkowe informacje w ulotce.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Tabletka do rozgryzania i żucia

6 tabletek do rozgryzania i żucia numer GTIN: 5906471630102

10 tabletek do rozgryzania i żucia numer GTIN: 5902802709905

12 tabletek do rozgryzania i żucia numer GTIN: 5906471630119

18 tabletek do rozgryzania i żucia numer GTIN: 5906471630126

20 tabletek do rozgryzania i żucia numer GTIN: 5906471630133

24 tabletki do rozgryzania i żucia numer GTIN: 5906471630140

25 tabletek do rozgryzania i żucia numer GTIN: 5902802709912

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE**8. TERMIN WAŻNOŚCI**

Termin ważności (EXP)

9. SPECJALNE WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE**11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO****Podmiot odpowiedzialny:**

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 133/151
95 - 200 Pabianice
{logo podmiotu odpowiedzialnego}

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr

13. NUMER SERII

Nr serii (Lot)

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC – Lek wydawany bez recepty.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

OTWÓRZ TUTAJ

Lek o szybkim działaniu na:

- zgagę
 - niestrawność
 - nadkwaśność
 - ból i pieczenie w nadbrzuszu
-
- Działa do 12 h
 - Lek o szybkim działaniu

Wskazania:

U dorosłych w krótkotrwałym leczeniu objawów związanych z nadkwaśnością soku żołądkowego, takich jak:

- zgaga;
- niestrawność,
- ból i pieczenie w nadbrzuszu.

Dawkowanie:

Dorośli: W celu złagodzenia objawów, należy żuć 1 tabletkę na dobę.

Nie należy połykać tabletek w całości.

Aby zapobiec zgadze, należy żuć 1 tabletkę, 15 do 60 minut przed jedzeniem lub piciem napojów, które powodują niestrawność.

Nie należy stosować dawki dobowej większej niż dwie tabletki.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE'A

Travisto RefluControl

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D
--

Nie dotyczy.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

Nie dotyczy.

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH

BLISTER

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Travisto RefluControl

20 mg + 165 mg + 800 mg, tabletki do rozgryzania i żucia

Famotidinum + Magnesii hydroxidum + Calcii carbonas

2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

{logo podmiotu odpowiedzialnego}

3. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP

4. NUMER SERII

Lot

5. INNE

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

PUDEŁKO TEKTUROWE

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Travisto RefluControl

20 mg + 165 mg + 800 mg, tabletki do rozgryzania i żucia

Famotidinum + Magnesii hydroxidum + Calcii carbonas

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

Skład: Każda tabletki zawiera 20 mg famotydyny, 165 mg magnezu wodorotlenku, 800 mg wapnia węglanu

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

oraz substancje pomocnicze, w tym glukozę (jako składnik dekstratów i maltodekstryny wchodzącej w skład aromatu miętowego) – dodatkowe informacje w ulotce.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Tabletka do rozgryzania i żucia

6 tabletek do rozgryzania i żucia numer GTIN: 5906471630102

10 tabletek do rozgryzania i żucia numer GTIN: 5902802709905

12 tabletek do rozgryzania i żucia numer GTIN: 5906471630119

18 tabletek do rozgryzania i żucia numer GTIN: 5906471630126

20 tabletek do rozgryzania i żucia numer GTIN: 5906471630133

24 tabletki do rozgryzania i żucia numer GTIN: 5906471630140

25 tabletek do rozgryzania i żucia numer GTIN: 5902802709912

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE**8. TERMIN WAŻNOŚCI**

Termin ważności (EXP)

9. SPECJALNE WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE**11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO****Podmiot odpowiedzialny:**

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 133/151
95 - 200 Pabianice
{logo podmiotu odpowiedzialnego}

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr

13. NUMER SERII

Nr serii (Lot)

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC – Lek wydawany bez recepty.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

OTWÓRZ TUTAJ

Lek o szybkim działaniu na:

- zgagę
 - niestrawność
 - nadkwaśność
 - ból i pieczenie w nadbrzuszu
-
- Działa do 12 h
 - Lek o szybkim działaniu

Wskazania:

U dorosłych w krótkotrwałym leczeniu objawów związanych z nadkwaśnością soku żołądkowego, takich jak:

- zgaga;
- niestrawność,
- ból i pieczenie w nadbrzuszu.

Dawkowanie:

Dorośli: W celu złagodzenia objawów, należy żuć 1 tabletkę na dobę.

Nie należy połykać tabletek w całości.

Aby zapobiec zgadze, należy żuć 1 tabletkę, 15 do 60 minut przed jedzeniem lub piciem napojów, które powodują niestrawność.

Nie należy stosować dawki dobowej większej niż dwie tabletki.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE'A

Travisto RefluControl

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D
--

Nie dotyczy.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

Nie dotyczy.

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH

BLISTER

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Travisto RefluControl

20 mg + 165 mg + 800 mg, tabletki do rozgryzania i żucia

Famotidinum + Magnesii hydroxidum + Calcii carbonas

2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

{logo podmiotu odpowiedzialnego}

3. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP

4. NUMER SERII

Lot

5. INNE