

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH**PUDEŁKO TEKTUROWE****1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO**

Nicorette Icy White Gum, 2 mg, guma do żucia, lecznicza

Nicotinum

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

Jedna guma zawiera jako substancję czynną 2 mg nikotyny, w postaci nikotyny z kationitem.

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Zawiera butylohydroksytoluen.

Dodatkowe informacje – patrz ulotka.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Guma do żucia, lecznicza

6 sztuk	kod EAN: 5909990863259
10 sztuk	kod EAN: 5909990835386
12 sztuk	kod EAN: 5909990835393
15 sztuki	kod EAN: 5909990835409
30 sztuk	kod EAN: 5909990835423
105 sztuk	kod EAN: 5909990835430
210 sztuk	kod EAN: 5909990835447

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE**8. TERMIN WAŻNOŚCI**

Termin ważności (EXP):

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Podmiot odpowiedzialny: McNeil AB, SE-251 09 Helsingborg, Szwecja.
(logo podmiotu odpowiedzialnego)

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: 17522

13. NUMER SERII

Nr serii (Lot):

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC - Lek wydawany bez recepty.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Lek nie zawiera cukru.

Dla osób wypalających nie więcej niż 20 papierosów na dobę.

Technika żucia:

1. Gumę należy żuć wolno do momentu pocucia smaku.
2. Następnie należy przerwać żucie i zatrzymać gumę między dziąsłem a policzkiem.
3. Należy zacząć żuć ponownie, gdy smak zaniknie.
4. Czynność tę należy powtarzać przez 30 minut. Gumę należy przestać żuć, gdy całkowicie straci smak.



Należy zastosować jedną gumę do żucia w momencie pojawienia się głodu nikotynowego. Zazwyczaj stosuje się 8-12 gum na dobę. Nie należy stosować więcej niż 15 gum na dobę.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEM BRAILLE’A

nicorette icy white gum 2 mg

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Nie dotyczy.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

Nie dotyczy.