

A. OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM**TEKTUROWE PUDEŁKO Z BUTELKĄ 50 ML I 100 ML****1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO**

Covexin 10 zawiesina do wstrzykiwań.

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Każdy 1 ml szczepionki zawiera:

toksoid <i>C. perfringens</i> typ A	≥ 0,9 U
toksoid <i>C. perfringens</i> typ B i C (β)	≥ 12,4 U
toksoid <i>C. perfringens</i> typ D (ε)	≥ 5,1 U
cała kultura <i>C. chauvoei</i> , inaktywowana	zgodnie z Ph. Eur.
toksoid <i>C. novyi</i>	≥ 1,2 U
toksoid <i>C. septicum</i>	≥ 3,6 U
toksoid <i>C. tetani</i>	≥ 2,5 U
toksoid <i>C. sordellii</i>	≥ 0,8 U
toksoid <i>C. haemolyticum</i>	≥ 16,5 U

3. WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

50 ml

100 ml

4. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Owce i bydło

5. WSKAZANIA LECZNICZE**6. DROGI PODANIA**

Podanie podskórne.

7. OKRESY KARENCJI

Okres karencji: Zero dni.

8. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Exp. {mm/rrrr}

Zawartość otwartego opakowania zużyć w ciągu 8 godzin.

9. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywać i transportować w stanie schłodzonym.
Nie zamrażać.
Przechowywać butelkę w opakowaniu zewnętrznym.
Chronić przed światłem.

10. NAPIS „PRZED UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ULOTKĘ.”
--

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

11. NAPIS „WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT”

Wyłącznie dla zwierząt.

12. NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI”
--

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

13. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO
--

Zoetis Polska Sp. z o.o.

14. NUMERY POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
--

2000/10

15. NUMER SERII

Lot {numer}

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU BEZPOŚREDNIM**BUTELKA 100 ML****1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO**

Covexin 10 zawiesina do wstrzykiwań

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Każdy 1 ml szczepionki zawiera:

toksoid <i>C. perfringens</i> typ A	≥ 0,9 U
toksoid <i>C. perfringens</i> typ B i C (β)	≥ 12,4 U
toksoid <i>C. perfringens</i> typ D (ε)	≥ 5,1 U
cała kultura <i>C. chauvoei</i> , inaktywowana	zgodnie z Ph. Eur.
toksoid <i>C. novyi</i>	≥ 1,2 U
toksoid <i>C. septicum</i>	≥ 3,6 U
toksoid <i>C. tetani</i>	≥ 2,5 U
toksoid <i>C. sordellii</i>	≥ 0,8 U
toksoid <i>C. haemolyticum</i>	≥ 16,5 U

100 ml

3. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Owce i bydło

4. DROGI PODANIA

Podanie podskórne.

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

5. OKRESY KARENCJI

Okres karencji: Zero dni.

6. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Exp. {mm/rrrr}

Zawartość otwartego opakowania zużyć w ciągu 8 godzin.

7. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywać i transportować w stanie schłodzonym.

Nie zamrażać.

Przechowywać butelkę w opakowaniu zewnętrznym.

Chronić przed światłem.

8. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Zoetis Polska Sp. z o.o.

9. NUMER SERII

Lot {numer}

**MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH
BEZPOŚREDNICH**

BUTELKA 50 ML

1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

Covexin 10

2. SKŁAD ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

toksoid *C. perfringens* typ A; toksoid *C. perfringens* typ B i C (β); toksoid *C. perfringens* typ D (ϵ);
cała kultura *C. chauvoei*, inaktywowana; toksoid *C. novyi*; toksoid *C. septicum*; toksoid *C. tetani*;
toksoid *C. sordellii*; toksoid *C. haemolyticum*.

50 ml

3. NUMER SERII

Lot {numer}

4. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Exp. {mm/rrrr}

Zawartość otwartego opakowania zużyć w ciągu 8 godzin.