

OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ I ULOTKA INFORMACYJNA

A. OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM

Tekturowe pudełko

1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

Lovapen 300 mg/ml zawiesina do wstrzykiwań

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH


Każdy ml zawiera:

Benzylopenicylina prokainowa 300 mg

3. WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

100 ml

4. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT



Koń, bydło, owca, świnia, pies, kot.

5. WSKAZANIA LECZNICZE

6. DROGI PODANIA

Podanie domięśniowe lub podskórne.
Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

7. OKRESY KARENCJI

Okresy karencji:

Tkanki jadalne:

Bydło, owce, świnie:

5 dni dla czasu trwania leczenia 3-5 dni

7 dni dla czasu trwania leczenia 6-7 dni

Konie:

14 dni dla czasu trwania leczenia 3-5 dni

16 dni dla czasu trwania leczenia 6-7 dni

Mleko:

Bydło, owce:

6 dni

Konie:

Produkt niedopuszczony do stosowania u kłaczy produkujących mleko przeznaczone do spożycia przez ludzi.

8. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Exp. {mm/rrrr}

Zawartość otwartego opakowania należy zużyć w ciągu 28 dni.

9. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w lodówce (2°C–8°C).

Po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego przechowywać w lodówce (2°C–8°C).

Nie zamrażać.

Przechowywać butelkę w pozycji pionowej.

10. NAPIS „PRZED UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ULOTKĘ.”

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

11. NAPIS „WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT”

Wyłącznie dla zwierząt.

12. NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI”

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

13. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Lovapharm Consulting B.V

14. NUMERY POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

15. NUMER SERII

Lot {numer}

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU BEZPOŚREDNIM

Szklana butelka

1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

Lovapen 300 mg/ml zawiesina do wstrzykiwań dla koni, bydła, owiec, świń, psów i kotów

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Każdy ml zawiera:

Benzylopenicylina prokainowa 300 mg

3. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Koń, bydło, owca, świnia, pies, kot.

4. DROGI PODANIA

Podanie domięśniowe lub podskórne.
Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

5. OKRESY KARENCJI

Okresy karencji:

Tkanki jadalne:

Bydło, owce, świnie:

5 dni dla czasu trwania leczenia 3-5 dni

7 dni dla czasu trwania leczenia 6-7 dni

Konie:

14 dni dla czasu trwania leczenia 3-5 dni

16 dni dla czasu trwania leczenia 6-7 dni

Mleko:

Bydło, owce:

6 dni

Konie:

Produkt niedopuszczony do stosowania u kłaczy produkujących mleko przeznaczone do spożycia przez ludzi.

6. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Exp. {mm/rrrr}

Zawartość otwartego opakowania należy zużyć w ciągu 28 dni.

7. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w lodówce (2°C–8°C).

Po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego przechowywać w lodówce (2°C–8°C).

Nie zamrażać.

Przechowywać butelkę w pozycji pionowej.

8. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Lovapharm Consulting B.V.

9. NUMER SERII

Lot {numer}