

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

TEKTUROWE PUDEŁKO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Benzydamine neo-angin smak cytrynowy,
3 mg, pastylki twarde
Benzydaminii hydrochloridum

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

Każda pastylka twarda zawiera jako substancję czynną 3 mg benzydaminii chlorowodoru (co odpowiada 2,68 mg benzydaminii).

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Substancje pomocnicze: izomalt (E 953), kwas cytrynowy jednowodny, aspartam (E 951), żółcień chinolinowa (E 104), olejek eteryczny miętowy, aromat cytrynowy.
Dalsze informacje, patrz ulotka.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

pastylka twarda

8 pastylek twardych	Kod: 5906750263144
10 pastylek twardych	Kod: 5906750263151
12 pastylek twardych	Kod: 5906750263168
16 pastylek twardych	Kod: 5906750263175
20 pastylek twardych	Kod: 5906750263199
24 pastylek twardych	Kod: 5906750263182
30 pastylek twardych	Kod: 5906750263205
40 pastylek twardych	Kod: 5906750263212
48 pastylek twardych	Kod: 5906750263229
100 (5 x 20) pastylek twardych	Kod: 5906750263236

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Podanie na błonę śluzową jamy ustnej. Jedną pastylkę należy rozpuszczać powoli w jamie ustnej.
Nie połykać, nie rozgryzać.
Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności (EXP):

9. SPECJALNE WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Brak specjalnych zaleceń dotyczących temperatury przechowywania leku. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w celu ochrony przed światłem.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

M.C.M. Klosterfrau Healthcare Sp. z o.o.
ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr:

13. NUMER SERII

Numer serii (Lot):

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC – Lek wydawany bez recepty.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Na ostry ból gardła. Działa przeciwzapalnie i przeciwbólowo.

Do stosowania w objawowym miejscowym leczeniu ostrego bólu gardła z towarzyszącymi typowymi objawami stanu zapalnego, takimi jak ból, zaczerwienienie lub obrzęk jamy ustnej i gardła u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku powyżej 6 lat.

Dawkowanie: dorośli, młodzież i dzieci w wieku powyżej 6 lat: 1 pastylka 3 razy na dobę. Nie stosować dłużej niż 7 dni. Jeśli w ciągu 3 dni nie nastąpi poprawa lub objawy nasilą się, należy skontaktować się z lekarzem.

Dalsze informacje, patrz ulotka.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE'A

Benzydamine neo-angin smak cytrynowy

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Nie dotyczy.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

Nie dotyczy.

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH

BLISTER

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Benzydamine neo-angin smak cytrynowy,
3 mg, pastylki twarde
Benzydaminii hydrochloridum

2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

M.C.M. Klosterfrau Healthcare Sp. z o.o.

3. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP

4. NUMER SERII

Lot

5. INNE