

## **OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ**

## INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

**PUDEŁKO TEKTUROWE, Adaring, (0,120 mg + 0,015 mg)/24h, system terapeutyczny dopochwowy**

### 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Adaring, (0,120 mg + 0,015 mg)/24h, system terapeutyczny dopochwowy

*Etonogestrelum + Ethinylestradiolum*

### 2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

Ilość etonogestrelu i etynyloestradiolu uwalnianych w ciągu 24h: odpowiednio 0,120 mg i 0,015 mg, przez okres 3 tygodni.

1 system zawiera 8,25 mg etonogestrelu i 2,60 mg etynyloestradiolu.

### 3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCZNICZYCH

Substancje pomocnicze:

Etylenu i octanu winylu kopolimer, 28% octanu winylu

Poliuretan

### 4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

System terapeutyczny dopochwowy

1 system dopochwowy numer GTIN: 05906414002232

3 systemy dopochwowe numer GTIN: 05906414002249

6 systemów dopochwowych numer GTIN: 05906414002508

### 5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Podanie dopochwowe.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

### 6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

### 7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

### 8. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP:

EXP = Termin ważności

Adaring należy użyć nie później niż miesiąc przed upływem terminu ważności.

**9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA**

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

**10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE****11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**

Adamed Pharma S.A.  
Pieńków, ul. M. Adamkiewicza 6A  
05-152 Czosnów  
(logo Adamed)

**12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU**

Pozwolenie nr: 24067

**13. NUMER SERII**

Lot:  
Lot = Nr serii

**14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI**

Rp – Lek wydawany na receptę.

**15. INSTRUKCJA UŻYCIA**

Miejsce na notatki pacjenta

**16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A**

adaring 0,120 mg + 0,015 mg

**17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D**

Obejmuje kod 2D będący nośnikiem niepowtarzalnego identyfikatora.

**18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA**

PC:  
SN:  
NN:

**MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA OPAKOWANIACH  
BEZPOŚREDNICH**

**SASZETKA, Adaring (0,120 mg + 0,015 mg)/24h, system terapeutyczny dopochwowy**

**1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO**

Adaring, (0,120 mg + 0,015 mg)/24h, system terapeutyczny dopochwowy

*Etonogestrelum + Ethinylestradiolum*

**2. SPOSÓB PODAWANIA**

**3. TERMIN WAŻNOŚCI**

EXP:

**4. NUMER SERII**

Lot:

**5. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY  
JEDNOSTEK**

1 saszetka zawiera 1 system dopochwowy.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

(logo Adamed)

**6. INNE**

**MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH DODATKOWO W OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH**

**Naklejki**

Naklejki, umieszczone odpowiedniego dnia w Twoim kalendarzu, pomogą Ci pamiętać, kiedy wprowadzić i usunąć system dopochwowy.

Wprowadzić system dopochwowy

Usunąć system dopochwowy

Naklejki, umieszczone odpowiedniego dnia w Twoim kalendarzu, pomogą Ci pamiętać, kiedy wprowadzić i usunąć system dopochwowy.



Wprowadzić system  
dopochwowy

Usunąć system  
dopochwowy