

PC: XXXXXXXXXXXXX
SN: XXXXXXXXXXXXX
Lot:
EXP:

Data
Matrix

PC & Batch details with Variable data.
Unique serial number on each carton
with 2D data Matrix shall be printed
during packaging.

BORTEZOMIB ADAMED

Bortezomibum 3,5 mg,
proszek do sporządzania
roztworu do wstrzykiwań

3,5 mg

1
fiolka

Wyłącznie do
podania podskórnego
lub dożylnego.


ADAMED

Lek przechowywać w miejscu
niewidocznym i niedostępnym
dla dzieci.

LEK CYTOTOKSYCZNY.

Specjalne wytyczne dotyczące
postępowania z produktem.

Jeżeli nie jest stosowany
natychmiast, **Bortezomib
Adamed** rozcieńczony w 0,9%
roztworze chlorku sodu
zachowuje stabilność przez 8
godzin, gdy przechowywany jest
w temperaturze 25°C/60%RH
w ciemności, w oryginalnej
fiolce i (lub) strzykawce.
Przechowywać fiolkę w opako-
waniu zewnętrznym w celu
ochrony przed światłem.
Wszelkie niewykorzystane
resztki produktu lub jego
odpady należy usunąć zgodnie
z lokalnymi przepisami.

Adamed Pharma S.A.
Pieńków, ul. M. Adamkiewicza 6A
05-152 Czosnów

Każda fiolka zawiera **3,5 mg**
bortezomibu (w postaci estru
mannitolu i kwasu boronowego).

Wykaz substancji pomocniczych:

Mannitol (E421). Należy zapoznać
się z treścią ulotki przed zastoso-
waniem leku. Wyłącznie do podania
podskórnego lub dożylnego.
Wyłącznie do jednorazowego użycia.
Nie podawać inną drogą.

Podanie dożylne:

dodać 3,5 ml 0,9% roztworu
chlorku sodu by uzyskać stężenie
1 mg/ml. **Podanie podskórne:**
dodać 1,4 ml 0,9% roztworu
chlorku sodu, aby uzyskać stężenie
2,5 mg/ml.

POZWOLENIE NR: 22587

Lz - Lek stosowany wyłącznie
w lecznictwie zamkniętym.

Lot = Nr serii
EXP = Termin ważności



BORTEZOMIB ADAMED

Bortezomibum 3,5 mg,
proszek do sporządzania
roztworu do wstrzykiwań

1 fiolka

BORTEZOMIB ADAMED

Bortezomibum 3,5 mg,
proszek do sporządzania
roztworu do wstrzykiwań

3,5 mg

EXP:
Lot:

BORTEZOMIB ADAMED

Bortezomibum 3,5 mg.



proszek do sporządzania
roztworu do wstrzykiwań.
Wyłącznie podanie
podskórne lub dożylnie.