

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

Tekturowe pudełko

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Calcium Sandoz + Vitamin C

260 mg jonów wapnia + 1000 mg witaminy C, tabletki musujące

Calcii lactogluconas + Calcii carbonas + Acidum ascorbicum

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Jedna tabletka musująca zawiera:

Substancje czynne:

Wapnia laktoglukonian	1,0 g	}	równoważne 260 mg lub 6,5 mmola wapnia zjonizowanego
Węglan wapnia	0,327 g		
Kwas askorbowy (witamina C)	1,0 g		

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Lek zawiera sacharozę oraz sól. Dalsze informacje znajdują się w ulotce.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Tabletka musująca

10 tabletek musujących Kod: 5909990252411

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Podanie doustne. Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności (EXP):

9. SPECJALNE WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Tubę przechowywać szczelnie zamkniętą.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Podmiot odpowiedzialny
Sandoz GmbH
Biochemiestrasse 10
6250 Kundl, Austria

{logo Sandoz}

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/2524

13. NUMER SERII

Nr serii (Lot):

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC - Lek wydawany bez recepty.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Wskazania

Zwiększone zapotrzebowanie na wapń i witaminę C:

- w okresie spadku odporności organizmu,
- w przebiegu chorób infekcyjnych,
- w okresie rekonwalescencji.

Leczenie następstw niedoborów wapnia i witaminy C.

Wspomagająco w leczeniu przeziębień i grypy.

U osób palących papierosy.

Dawkowanie i sposób stosowania

Tabletkę musującą rozpuścić w szklance wody.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 7 lat:

1 tabletka musująca raz na dobę.

Dzieci w wieku od 3 do 7 lat:

0,5 tabletki musującej raz na dobę.

Niemowlęta: zgodnie z zaleceniami lekarza.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

Calcium Sandoz + Vitamin C

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D
--

Nie dotyczy.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

Nie dotyczy.

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH

Tuba

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Calcium Sandoz + Vitamin C
260 mg jonów wapnia + 1000 mg witaminy C, tabletki musujące
Calcii lactogluconas + Calcii carbonas + Acidum ascorbicum

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Jedna tabletkę musująca zawiera:

260 mg lub 6,5 mmola wapnia zjonizowanego (w postaci laktoglukonianu oraz węglanu),
1,0 g kwasu askorbowego (witaminy C)

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Lek zawiera sacharozę oraz sól.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Tabletka musująca

10 tabletek musujących

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Podanie doustne. Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP:

9. SPECJALNE WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Tubę przechowywać szczelnie zamkniętą.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

{logo Sandoz}

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

13. NUMER SERII

Lot:

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Wskazania

Zwiększone zapotrzebowanie na wapń i witaminę C:

- w okresie spadku odporności organizmu,
- w przebiegu chorób infekcyjnych,
- w okresie rekonwalescencji.

Leczenie następstw niedoborów wapnia i witaminy C.

Wspomagająco w leczeniu przeziębień i grypy.

U osób palących papierosy.

Dawkowanie i sposób stosowania

Tabletkę musującą rozpuścić w szklance wody.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 7 lat:

1 tabletka musująca raz na dobę.

Dzieci w wieku od 3 do 7 lat:

0,5 tabletki musującej raz na dobę.

Niemowlęta: zgodnie z zaleceniami lekarza.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA