

PUDEŁKO TEKTUROWE

AESCIN

(20 mg + 50 mg + 50 j.m.)/g, zel

Escinum + Diethylamini salicylas + Heparinum

Jeden gram żelu zawiera 20 mg alfa-escyny, 50 mg salicylanu dwuetyloaminy, 50 j. m. heparyny.

Substancje pomocnicze: karbomer, trolamina, alkohol izopropylowy, metylu parahydroksybenzoetan (E 218), propylu parahydroksybenzoetan (E 216), disodu edetynian, woda oczyszczona.

Zel

40 g

Kod: 5909990126019

Podanie na skórę.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności (EXP):

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa

{logo podmiotu odpowiedzialnego}

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: R/1260

13. NUMER SERII

Numer serii (Lot):

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC - Lek wydawany bez recepty.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Wiek	Ilość	Częstość
Dorośli	Cienka warstwa żelu	3 do 5 razy na dobę

Działanie:

- Przeciwbólowe
- Przeciwzakrzepowe
- Przeciwzapalne
- Przeciwobrzękowe
- Bóle i ciężkość nóg

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

Aescin żel, (20 mg + 50 mg + 50 j.m.)/g

17. INNE

Nie dotyczy.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D
--

Nie dotyczy.

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH**TUBA****1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO**

AESCIN, (20 mg + 50 mg + 50 j.m.)/g, żel
Escinum + Diethylamini salicylas + Heparinum

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Jeden gram żelu zawiera 20 mg alfa-escyny, 50 mg salicylanu dwuetyloaminy, 50 j. m. heparyny.

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Substancje pomocnicze m.in.: metylu parahydroksybenzoesan (E 218), propylu parahydroksybenzoesan (E 216).

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Żel 40 g
Podanie na skórę.
Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE**8. TERMIN WAŻNOŚCI**

EXP:

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

11. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Logo Teva

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: R/1260

13. NUMER SERII

Lot:

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC - Lek wydawany bez recepty.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Wiek	Ilość	Częstość
Dorośli	Cienka warstwa żelu	3 do 5 razy na dobę

Działanie:

- Przeciwbólowe
- Przeciwzakrzepowe
- Przeciwzapalne
- Przeciwobrzękowe
- Bóle i ciężkość nóg

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A**17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D**

Nie dotyczy.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

Nie dotyczy.