

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH**PUDEŁKO TEKSTUROWE****1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO**

Aesculan (62,5 mg + 5 mg)/g maść doodbytnicza
Hippocastani corticis extractum siccum + Lidocaini hydrochloridum monohydratum

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Skład: 1 g maści doodbytnicznej zawiera substancje czynne: wyciąg suchy z kory kasztanowca 62,5 mg (*Hippocastani corticis extractum siccum*, DER 40-90:1, ekstrahent: metanol 90% (v/v)); lidokainy chlorowodorek jednowodny 5 mg.

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Substancje pomocnicze: tanina, olejek eteryczny rumiankowy, makrogol 300, wazelina biała, lanolina, parafina ciekła, bronopol, woda oczyszczona.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

maść doodbytnicza

30 g 5 9 0 9 9 9 0 0 2 8 1 1 5

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Sposób stosowania: należy zapoznać się z ulotką informacyjną dołączoną do opakowania.
Droga podania: doodbytniczo.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

Należy umyć ręce po każdorazowym zastosowaniu.

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności (EXP):

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE**11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**

Podmiot odpowiedzialny:
Poznańskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A.
ul. Towarowa 47/51, 61-896 Poznań, Polska

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/0281

13. NUMER SERII

Nr serii (Lot):

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

Lek wydawany bez przepisu lekarza – OTC.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Lek przeznaczony dla dorosłych.

choroba hemoroidalna

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

Aesculan

**MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH
BEZPOŚREDNICH**

TUBA ALUMINIOWA

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO I DROGA PODANIA

Aesculan (62,5 mg + 5 mg)/g maść doodbytnicza
Hippocastani corticis extractum siccum + Lidocaini hydrochloridum monohydratum

2. SPOSÓB PODAWANIA

SPOSÓB STOSOWANIA Dorośli: o ile lekarz nie zaleci inaczej, należy za pomocą załączonej kaniuli nałożyć lek na chore miejsce lub wcisnąć do odbytnicy ok. 0,5 - 1,0 g (pasmo leku o długości ok. 2 cm), 2 - 3 razy dziennie, aż do ustąpienia ostrych objawów. Następnie dawkę można zmniejszyć stosując maść raz na dobę. Lek należy stosować do ustąpienia objawów.

3. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP

4. NUMER SERII

Lot

**5. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY
JEDNOSTEK**

30 g

6. INNE

SKŁAD 1 g maści doodbytnicznej zawiera substancje czynne: wyciąg suchy z kory kasztanowca 62,5 mg (*Hippocastani corticis extractum siccum*, DER 40-90:1, ekstrahent: metanol 90% (v/v)); lidokainy chlorowodorek jednowodny 5 mg.

choroba hemoroidalna

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

Podmiot odpowiedzialny:
Poznańskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A.