

**INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH
PUDEŁKO TEKSTUROWE**

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

COCCULINE
Tabletki

Homeopatyczny produkt leczniczy.

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

SKŁAD

1 tabletka zawiera:

Substancje czynne:

Cocculus indicus	4 CH	0,375 mg
Nux vomica	4 CH	0,375 mg
Tabacum	4 CH	0,375 mg
Petroleum rectificatum	4 CH	0,375 mg

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: sacharoza, laktoza.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

30 tabletek

Kod GTIN (EAN UCC): 5909990022243

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

**6. OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU
LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI**

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności (EXP): data drukowana podczas produkcji

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

**10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA
NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO
ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE**

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Podmiot odpowiedzialny
BOIRON SA
2 avenue de l'Ouest Lyonnais
69510 Messimy
Francja

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr IL-3006/LN-H.

13. NUMER SERII

Nr serii (LOT): *numer drukowany podczas produkcji*

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC – lek wydawany bez recepty.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Choroba lokomocyjna
wspomagająco

WSKAZANIA DO STOSOWANIA

Wspomagająco w objawach choroby lokomocyjnej (np.: nudności, ogólne złe samopoczucie) podczas podróży samochodowej, lotniczej lub morskiej.

DAWKOWANIE I SPOSÓB PODAWANIA

Dorośli, młodzież i dzieci w wieku od 5 lat:

- w przeddzień i w dniu podróży ssąć powoli po 2 tabletki 3 razy dziennie
- od momentu wystąpienia pierwszych objawów choroby w czasie podróży, ssąć powoli po 2 tabletki, zwiększając odstępy pomiędzy kolejnymi dawkami leku w miarę następowania poprawy. W momencie ustąpienia objawów należy zaprzestać przyjmowania leku.

Nie przekraczać dawki 6 tabletek w ciągu doby.

Dzieci w wieku do 5 lat: wg wskazań lekarza.

Ze względu na niebezpieczeństwo zakrztuszenia dzieciom w wieku do 5 lat lub dzieciom starszym, które mają problem z połykaniem, zaleca się rozdrobnienie tabletek i podanie w niewielkiej ilości wody.

*piktogram postaci farmaceutycznej
logo podmiotu odpowiedzialnego*

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE'A

cocculine

**MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH
LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH
*BLISTER***

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

COCCULINE

2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

BOIRON

3. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP:

4. NUMER SERII

LOT:

5. INNE