

Etykieta na butelkę  
**DIABETOFORT**

**DIABETOFORT** Płyn doustny

**Wskazania do stosowania:**

Produkt leczniczy tradycyjnie stosowany w zaburzeniach w oddawaniu moczu. W porozumieniu z lekarzem lek może być stosowany przez osoby z rodzinną predyspozycją do cukrzycy jako wspomagający środek moczopędny, zmniejszający tendencję do wzrostu cukru po posiłku (w przypadkowej hiperglikemii).

**Dawkowanie:**

**Dorośli i młodzież powyżej 12 lat:** 5 ml leku do 4 razy na dobę, po posiłku. **Dzieci poniżej 12 lat:** Nie zaleca się stosowania u dzieci poniżej 12 lat ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa i zawartość alkoholu.

**Sposób podawania:** Płyn przeznaczony do podania doustnego. Należy odmierzyć pojedynczą dawkę poprzez przelanie leku z butelki do miarki, a następnie uzupełnić miarkę wodą lub sokiem owocowym i całość wypić. W razie potrzeby popić wodą. W czasie stosowania leku zaleca się przyjmowanie większej ilości płynów.

**Nr serii:**

**Termin ważności:**

**Podmiot odpowiedzialny:**

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „Leki Natury” Tadeusz Polański Sp. z o.o.  
08-500 Ryki, ul. Zielona 30

100g

**Informacje umieszczone na opakowaniach zewnętrznych**  
**DIABETOFORT**

**DIABETOFORT**

Płyn doustny

100g

**Zawartość substancji czynnych:**

1 ml płynu doustnego zawiera 1 ml wyciągu płynnego złożonego (1:1) z: *Phaseolus vulgaris* L., *pericarpium* (owocnia fasoli) / *Betula pendula* Roth i/lub *Betula pubescens* Ehrh. ale także krzyżówki tych gatunków, *folium* (liść brzozy) / *Agropyron repens*, *rhizoma* (kłącze perzu) / *Rubus fruticosus* L., *folium* (liść jeżyny) / *Rosa canina* L., *Rosa pendulina* L. i inne gatunki *Rosa species*, *fructus* (owoc róży) (30/20/20/20/10). Rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 70% (V/V).

Zawartość etanolu w produkcie 60-70% (V/V).

**Wskazania do stosowania:**

Produkt leczniczy tradycyjnie stosowany w zaburzeniach w oddawaniu moczu. W porozumieniu z lekarzem lek może być stosowany przez osoby z rodzinną predyspozycją do cukrzycy jako wspomagający środek moczopędny, zmniejszający tendencję do wzrostu cukru po posiłku (w przypadkowej hiperglikemii).

**Sposób stosowania i droga podania:**

**Dorośli i młodzież powyżej 12 lat:**

5 ml leku do 4 razy na dobę, po posiłku.

**Dzieci poniżej 12 lat:**

Nie zaleca się stosowania u dzieci poniżej 12 lat ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa i zawartość alkoholu.

**Sposób podawania:**

Płyn przeznaczony do podania doustnego.

Należy odmierzyć pojedynczą dawkę poprzez przelanie leku z butelki do miarki, a następnie uzupełnić miarkę wodą lub sokiem owocowym i całość wypić. W razie potrzeby popić wodą. W czasie stosowania leku zaleca się przyjmowanie większej ilości płynów.

**Czas stosowania:**

Jeśli po upływie 5 dni stosowania leku nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

**Sposób przechowywania:**

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C. Dopuszczalne jest lekkie zmętnienie powstałe w czasie przechowywania. Leku nie stosować po upływie terminu ważności podanym na opakowaniu. Przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

**Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.**

Produkt leczniczy wydawany bez recepty – OTC

**Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego:**

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „Leki Natury” Tadeusz Polański Sp. z o.o.

08-500 Ryki,

ul. Zielona 30,

tel. (81) 865 10 69

Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 15510

Nr serii:

Termin ważności:

Kod kreskowy 5909990699346

Informacja w systemie BRAILLE