

## INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

Pudełko tekturowe

### 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Aleric Deslo Active, 2,5 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej  
*Desloratadinum*

### 2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

1 tabletki ulegająca rozpadowi w jamie ustnej zawiera 2,5 mg desloratadyny.

### 3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Lek zawiera także aspartam (E 951).

### 4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

5 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej – Kod 5909991013158  
6 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej – Kod 5909991013165  
10 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej – Kod 5909991013172

### 5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Podanie doustne.  
Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

### 6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

### 7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

### 8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności (EXP):

### 9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

**10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE**

**11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**

**Podmiot odpowiedzialny**

US Pharmacia Sp. z o.o.,  
ul. Ziębicka 40,  
50-507 Wrocław  
{tel.} 22 543 60 00  
{logotyp podmiotu odpowiedzialnego}

**12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU**

Pozwolenie nr: 20562

**13. NUMER SERII**

Nr serii (Lot):

**14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI**

OTC- Lek wydawany bez recepty.

**15. INSTRUKCJA UŻYCIA**

- Lek przeciwalergiczny
- Stosować raz na dobę (24h)
- Bez konieczności popijania
- Dla dzieci w wieku 6 lat i starszych oraz dorosłych

**Dawkowanie i sposób podania:**

Dzieci w wieku 6 do 11 lat: 1 tabletkę ulegającą rozpadowi w jamie ustnej raz na dobę.

Dorośli i młodzież (w wieku 12 lat i więcej): 2 tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej raz na dobę.

Bliстер należy ostrożnie otworzyć bezpośrednio przed użyciem. Wyjąć tabletkę i umieścić w jamie ustnej, gdzie ulega natychmiastowemu rozpadowi. Woda lub inne płyny nie są potrzebne, aby połknąć dawkę.

Tabletkę można przyjmować niezależnie od posiłku.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

{graficzna instrukcja sposobu otwierania blistra}

**16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE'A**

aleric deslo active 2,5 mg