

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH I OPAKOWANIACH FOLIOWYCH

BLISTER

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Excedrin MigraSTOP
250 mg + 250 mg + 65 mg, tabletki powlekane
Acidum acetylsalicylicum + Paracetamolum + Coffeinum

2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Haleon Poland Sp. z o.o.

3. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności

4. NUMER SERII

Numer serii

5. INNE

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH**PUDEŁKO TEKTUROWE****1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO**

Excedrin MigraStop

250 mg + 250 mg + 65 mg, tabletki powlekane

Acidum acetylsalicylicum + *Paracetamolum* + *Coffeinum*

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ(YCH)

Jedna tabletka powlekana zawiera:

250 mg kwasu acetylosalicylowego, 250 mg paracetamolu, 65 mg kofeiny.

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH**4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA**

10 tabletek powlekanych	kod 5909990765522
16 tabletek powlekanych	kod 5909991087722
20 tabletek powlekanych	kod 5909990765539
30 tabletek powlekanych	kod

32 tabletki powlekane	kod 5909991087739
-----------------------	-------------------

5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA

Stosować doustnie.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

Lek zawiera paracetamol

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności:

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE
--

Brak specjalnych wymagań dotyczących usuwania leku

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO
--

Podmiot odpowiedzialny:

Haleon Poland Sp. z o.o.

ul. Rzymowskiego 53

02-697 Warszawa

<logo podmiotu odpowiedzialnego>

12. NUMER(Y) POZWOLENIA(N) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Nr pozwolenia: 16490

13. NUMER SERII

Numer serii

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC - Lek wydawany bez recepty.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Doraźne leczenie bólu głowy i napadów migreny z aurą lub bez aury.

Dawkowanie

Dorośli (powyżej 18 lat):

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Nie należy stosować leku Excedrin MigraStop dłużej niż 4 dni w bólu głowy lub 3 dni w migrenie bez konsultacji z lekarzem.

Nie należy stosować dawki większej niż 6 tabletek na dobę w obu wskazaniach.

Przeciwwskazania, specjalne ostrzeżenia: Przed użyciem należy zapoznać się z treścią ulotki.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

excedrin migrastop

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D
--

Nie dotyczy.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

Nie dotyczy.