

**INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH
PUDEŁKO TEKTUROWE**

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Fervex bez cukru, 500 mg + 200 mg + 25 mg, granulat do sporządzania roztworu doustnego
Paracetamolum + Acidum ascorbicum + Pheniramin maleas

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Każda saszetka zawiera: 500 mg paracetamolu, 200 mg kwasu askorbowego, 25 mg feniraminy maleinianu

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

oraz substancje pomocnicze: aspartam (E 951), mannitol (E 421) i śladowe ilości etanolu w aromacie. Szczegółowe informacje - patrz ulotka.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Granulat do sporządzania roztworu doustnego
8 saszetek numer GTIN: 5909990851010

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Podanie doustne.
Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

**6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU
LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA
DZIECI**

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

Lek zawiera paracetamol.
Nie stosować z innymi lekami zawierającymi paracetamol i o podobnym składzie. W razie przedawkowania należy skontaktować się z lekarzem.

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności (EXP):

9. SPECJALNE WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Podmiot odpowiedzialny:

UPSA SAS
3 rue Joseph Monier
92500 Rueil-Malmaison, Francja
{logo podmiotu odpowiedzialnego}

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: 8510

13. NUMER SERII

Nr serii (Lot):

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC- Lek wydawany bez recepty

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Leczy doraźnie objawy przeziębienia i grypy:
GORĄCZKA
BÓL GŁOWY
ZAPALENIE BŁONY ŚLIZOWEJ NOSA I GARDŁA

Działanie

Działa przeciwbólowo, przeciwgorączkowo, zmniejsza przekrwienie i obrzęk błon śluzowych przez co udrażnia przewody nosowe, hamuje odruch kichania i łzawienie oczu.

Wskazania do stosowania

Doraźne leczenie objawów:

- grypy
 - przeziębienia
 - stanów grypopodobnych (ból głowy, gorączka, zapalenie błony śluzowej nosa i gardła)
- u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 15 lat.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE'A

fervex bez cukru

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D
--

Nie dotyczy

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

Nie dotyczy

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH
SASZETKA

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO I DROGA PODANIA

Fervex bez cukru, 500 mg + 200 mg + 25 mg, granulat do sporządzania roztworu doustnego
Paracetamolum + Acidum ascorbicum + Pheniramini maleas
Podanie doustne.

2. SPOSÓB PODAWANIA

Zawartość saszetki rozpuścić w szklance gorącej lub zimnej wody.

3. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP:

4. NUMER SERII

Lot:

5. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY JEDNOSTEK

Każda saszetka zawiera: 500 mg paracetamolu, 200 mg kwasu askorbowego, 25 mg feniraminy maleinianu.

6. INNE

LECZY DORAŹNIE OBJAWY PRZEZIĘBIENIA I GRYPY

UPSA SAS

{logo podmiotu odpowiedzialnego}