

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

PUDEŁKO TEKTUROWE

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Fervex cytrynowy, 500 mg + 200 mg + 25 mg, granulat do sporządzania roztworu doustnego
Paracetamolum + Acidum ascorbicum + Pheniraminini maleas

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Każda saszetka zawiera: 500 mg paracetamolu, 200 mg kwasu askorbowego, 25 mg feniraminy maleinianu

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

oraz substancje pomocnicze: 7,6 g sacharozy; 195 mg glukozy i 5 mg fruktozy (składniki maltodekstryny); 7 mg etanolu, syrop cukrowy w aromacie. Szczegółowe informacje - patrz ulotka.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Granulat do sporządzania roztworu doustnego

5 saszetek numer GTIN: 5909990363124

8 saszetek numer GTIN: 5909990363117

12 saszetek numer GTIN: 5909991274382

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

Lek zawiera paracetamol.

Nie stosować z innymi lekami zawierającymi paracetamol i o podobnym składzie. W razie przedawkowania należy skontaktować się z lekarzem.

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności (EXP):

9. SPECJALNE WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Podmiot odpowiedzialny:

UPSA SAS
3 rue Joseph Monier
92500 Rueil-Malmaison, Francja
{logo podmiotu odpowiedzialnego}

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: R/3631

13. NUMER SERII

Nr serii (Lot):

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC - Lek wydawany bez recepty

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Leczy doraźnie objawy przeziębienia i grypy:

GORĄCZKA
BÓL GŁOWY
ZAPALENIE BŁONY ŚLUZOWEJ NOSA I GARDŁA

Działanie

Działa przeciwbólowo, przeciwgorączkowo, zmniejsza przekrwienie i obrzęk błon śluzowych, przez co udrażnia przewody nosowe, hamuje odruch kichania i łzawienie oczu.

Wskazania do stosowania

Doraźne leczenie objawów:

- grypy
- przeziębienia
- stanów grypopodobnych (ból głowy, gorączka, zapalenie błony śluzowej nosa i gardła) u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 15 lat.

Zaleca się, aby po sporządzeniu roztwór przechowywać nie dłużej niż trzy godziny.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

ferveX cytrynowy

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Nie dotyczy

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

Nie dotyczy

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH

SASZETKA

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO I DROGA PODANIA

Fervex cytrynowy, 500 mg + 200 mg + 25 mg, granulat do sporządzania roztworu doustnego
Paracetamolum + Acidum ascorbicum + Pheniramin maleas
Podanie doustne.

2. SPOSÓB PODAWANIA

Zawartość saszetki rozpuścić w szklance gorącej lub zimnej wody.

3. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP:

4. NUMER SERII

Lot:

5. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY JEDNOSTEK

Każda saszetka zawiera: 500 mg paracetamolu, 200 mg kwasu askorbowego, 25 mg feniraminy maleinianu.

6. INNE

LECZY DORAŹNIE OBJAWY PRZEZIĘBIENIA I GRYPY

UPSA SAS

{logo podmiotu odpowiedzialnego}