

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

Pudelko tekturowe

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Fervex Junior, 280 mg + 100 mg + 10 mg
granulat do sporządzania roztworu doustnego
Paracetamolum + Acidum ascorbicum + Pheniramin maleas

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Każda saszetka zawiera: 280 mg paracetamolu, 100 mg kwasu askorbowego, 10 mg feniraminy maleinianu

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

oraz substancje pomocnicze: mannitol, potas, alkohol benzylový oraz śladowe ilości czerwieni Allura AC (E129), żółci pomarańczowej FCF (E110), etanolu, benzoianu sodu (E211), glikolu propylenowego (E1520) w aromacie. Szczegółowe informacje - patrz ulotka.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Granulat do sporządzania roztworu doustnego
8 saszetek numer GTIN: 5909990847310
12 saszetek numer GTIN: 5909991275907

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Podanie doustne.
Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

Lek zawiera paracetamol. Nie stosować z innymi lekami zawierającymi paracetamol i o podobnym składzie. W razie przedawkowania skontaktować się z lekarzem.

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności (EXP):

9. SPECJALNE WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Podmiot odpowiedzialny:

UPSA SAS

3 rue Joseph Monier

92500 RUEIL-MALMAISON, Francja

{logo podmiotu odpowiedzialnego}

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: 8473

13. NUMER SERII

Nr serii (Lot):

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC - Lek wydawany bez recepty

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Leczy doraźnie objawy przeziębienia i grypy:

GORĄCZKA

BÓL GŁOWY

ZAPALENIE BŁONY ŚLIZOWEJ NOSA I GARDŁA

dla dzieci w wieku powyżej 6 lat

Działanie

Działa przeciwbólowo, przeciwgorączkowo, zmniejsza przekrwienie i obrzęk błon śluzowych, hamuje odruch kichania i łzawienie oczu.

Wskazania do stosowania

Doraźne leczenie objawów:

- grypy
- przeziębienia
- stanów grypopodobnych (ból głowy, gorączka, zapalenie błony śluzowej nosa i gardła) u dzieci w wieku powyżej 6 lat.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE'A

fervex junior

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D
--

Nie dotyczy.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

Nie dotyczy.

**MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH
BEZPOŚREDNICH**
SASZETKA

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO I DROGA PODANIA

Fervex Junior, 280 mg + 100 mg + 10 mg
granulat do sporządzania roztworu doustnego
Paracetamolum + Acidum ascorbicum + Pheniramini maleas
Podanie doustne.

2. SPOSÓB PODAWANIA

Zawartość saszetki rozpuścić w szklance ciepłej lub zimnej wody.

3. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP:

4. NUMER SERII

Lot:

**5. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY
JEDNOSTEK**

Każda saszetka zawiera: 280 mg paracetamolu, 100 mg kwasu askorbowego, 10 mg feniraminy
maleinianu.

6. INNE

LECZY DORAŹNIE OBJAWY PRZEZIĘBIENIA I GRYPY

dla dzieci w wieku powyżej 6 lat

UPSA SAS
{logo podmiotu odpowiedzialnego}