

## **A. OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ**

## INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM

### PUDEŁKO TEKTUROWE

#### 1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

Floron inj., 300 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań

#### 2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

1 ml zawiera:

Florfenikol            300 mg

#### 3. WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

50 ml

100 ml

250 ml

#### 4. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Bydło (cielęta), świnia



#### 5. WSKAZANIA LECZNICZE

#### 6. DROGI PODANIA

Przy dawkach przekraczających 10 ml u bydła i 5 ml u świń lek należy podawać w kilka miejsc. Do podawania używać suchych, sterylnych igieł oraz strzykawek.

Bydło: Lek należy podawać domięśniowo najlepiej w mięśnie szyi lub podskórnie w okolicę szyi.  
Świnie: Lek należy podawać tylko domięśniowo najlepiej w mięśnie szyi.

#### 7. OKRESY KARENCJI

Okres karencji:

Bydło:

Tkanki jadalne:

- po podaniu domięśniowym: 30 dni

- po podaniu podskórnym: 44 dni

Mleko:

Produkt niedopuszczony do stosowania u zwierząt produkujących mleko przeznaczone do spożycia przez ludzi.

Świnie:

Tkanki jadalne: 14 dni

|                                 |
|---------------------------------|
| <b>8. TERMIN WAŻNOŚCI SERII</b> |
|---------------------------------|

Exp. {mm/rrrr}

Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 28 dni.

|                                                               |
|---------------------------------------------------------------|
| <b>9. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA</b> |
|---------------------------------------------------------------|

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>10. NAPIS „PRZED UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ULOTKĘ.”</b> |
|------------------------------------------------------------|

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

|                                           |
|-------------------------------------------|
| <b>11. NAPIS „WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT”</b> |
|-------------------------------------------|

Wyłącznie dla zwierząt.

|                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>12. NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI”</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------|

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

|                                            |
|--------------------------------------------|
| <b>13. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO</b> |
|--------------------------------------------|

KRKA

|                                                        |
|--------------------------------------------------------|
| <b>14. NUMERY POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU</b> |
|--------------------------------------------------------|

Pozwolenie nr 1855/08

|                        |
|------------------------|
| <b>15. NUMER SERII</b> |
|------------------------|

Lot {numer}

**INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU BEZPOŚREDNIM****BUTELKA ZE SZKŁA (TYPU I)****1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO**

Floron inj., 300 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań

**2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH**

1 ml zawiera:

Florfenikol            300 mg

**3. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT**

Bydło (ciełeta), świnia

**4. DROGI PODANIA**

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

Przy dawkach przekraczających 10 ml u bydła i 5 ml u świń lek należy podawać w kilka miejsc.

Do podawania używać suchych, sterylnych igieł oraz strzykawek.

Bydło: Lek należy podawać domięśniowo najlepiej w mięśnie szyi lub podskórnie w okolicę szyi.

Świnie: Lek należy podawać tylko domięśniowo najlepiej w mięśnie szyi.

**5. OKRESY KARENCJI**

Okres karencji:

Bydło:

Tkanki jadalne:

- po podaniu domięśniowym:    30 dni

- po podaniu podskórnym:       44 dni

Mleko:

Produkt niedopuszczony do stosowania u zwierząt produkujących mleko przeznaczone do spożycia przez ludzi.

Świnie:

Tkanki jadalne:                            14 dni

**6. TERMIN WAŻNOŚCI SERII**

Exp. {mm/rrrr}

Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 28 dni.

|                                                               |
|---------------------------------------------------------------|
| <b>7. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA</b> |
|---------------------------------------------------------------|

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

|                                           |
|-------------------------------------------|
| <b>8. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO</b> |
|-------------------------------------------|

KRKA

|                       |
|-----------------------|
| <b>9. NUMER SERII</b> |
|-----------------------|

Lot {numer}

Dodatkowe informacje:

50 ml  
100 ml  
250 ml