

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

Pudelko tekturowe

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Alopexy, 50 mg/ml, roztwór na skórę
Minoxidilum

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

1 ml roztworu zawiera 50 mg minoksydyłu.

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Substancje pomocnicze: glikol propylenowy, etanol (96%), woda oczyszczona.
Dodatkowe informacje, patrz ulotka.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Roztwór na skórę.

Butelka 60 ml z zakrętką z zabezpieczeniem przed dostępem dzieci oraz z pipetką dozującą i pompką dozującą z aplikatorem. Opakowanie zawiera 1 butelkę, wystarczającą na 1 miesiąc leczenia.

numer GTIN: 5909990842360

3 butelki 60 ml z zakrętką z zabezpieczeniem przed dostępem dzieci oraz z pipetką dozującą i pompką dozującą z aplikatorem. Opakowanie zawiera 3 butelki, wystarczające na 3 miesiące leczenia.

numer GTIN: 5909990842377

Butelka 60 ml z zakrętką z zabezpieczeniem przed dostępem dzieci oraz z pipetką dozującą.
Opakowanie zawiera 1 butelkę, wystarczającą na 1 miesiąc leczenia.

numer GTIN: 3573994008972

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Podanie na skórę. Do stosowania zewnętrznego.

Nie spożywać.

Dawkowanie: stosować dawkę 1 ml na skórę owłosionej głowy, dwa razy na dobę, zaczynając od środka leczzonej powierzchni.

Nie przekraczać całkowitej dawki dobowej wynoszącej 2 ml, niezależnie od wielkości leczzonej powierzchni.

Do butelki dołączone są pipetka oraz pompka dozująca z aplikatorem. **Do butelki dołączona jest pipetka dozująca.**

Należy dokładnie przeczytać sposób stosowania zamieszczony w ulotce dla pacjenta.



lub



6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

Nie połykać. Nie wdychać.



Po każdorazowym użyciu przemyć aplikator gorącą wodą.

Nie połykać. Nie wdychać.

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności (EXP):

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Produkt łatwopalny.

Przechowywać z dala od źródła ciepła, gorących powierzchni, iskiei, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić papierosów.

Okres ważności po pierwszym otwarciu butelki: 1 miesiąc.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Pierre Fabre Medicament
Les Cauquillous
81500 Lavaur
Francja

{logo podmiotu odpowiedzialnego}

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 17842

13. NUMER SERII

Nr serii (Lot):

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC – lek wydawany bez recepty.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Lek Alopexy jest wskazany u mężczyzn w przypadku wypadania włosów o umiarkowanym nasileniu (łysienie androgenowe).

Minoksydyl stymuluje wzrost włosów.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

alopexy

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D
--

Nie dotyczy.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

Nie dotyczy.

**MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH
BEZPOŚREDNICH**

Butelka

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Alopexy, 50 mg/ml, roztwór na skórę
Minoxidilum

Podanie na skórę

2. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA

Do stosowania zewnętrznego.
Nie spożywać.

3. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP:

4. NUMER SERII

Lot:

**5. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY
JEDNOSTEK**

60 ml

6. INNE

Okres ważności po pierwszym otwarciu butelki: 1 miesiąc.
Pierre Fabre {logo}