

## INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

Tekturowe pudełko

### 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

**Fluimucil Muko Junior**

*Acetylcysteinum*

100 mg, granulat do sporządzania roztworu doustnego

### 2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

**Skład:**

1 saszetka (1 g granulatu) zawiera substancję czynną: 100 mg acetylocysteiny

### 3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

oraz substancje pomocnicze m.in. aspartam, sorbitol,  $\beta$ -karoten (zawiera sacharozę i mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu), aromat pomarańczowy (zawiera glukozę i laktozę).  
Więcej informacji w ulotce dla pacjenta.

### 4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

granulat do sporządzania roztworu doustnego

20 saszetek      Kod EAN 13: 5909990724314

### 5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

### 6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

**Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.**

### 7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

### 8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności:

### 9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

**10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE**

**11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**

**Podmiot odpowiedzialny**

ZAMBON S.p.A.

Via Lillo del Duca, 10

20091 Bresso (MI), Włochy

<Logo podmiotu odpowiedzialnego>

**12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU**

Numer pozwolenia: R/7243

**13. NUMER SERII**

Numer serii:

**14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI**

**OTC - Lek wydawany bez recepty**

**15. INSTRUKCJA UŻYCIA**

Instrukcja użycia:

Rozpuścić zawartość saszetki w połowie szklanki letniej wody, w razie potrzeby wymieszać łyżką.

Uzyskany roztwór jest gotowy do wypicia. Roztwór należy wypić bezpośrednio po przygotowaniu.

**16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE'A**

Fluimucil Muko Junior

**17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR - KOD 2D**

Nie dotyczy.

**18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR - DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA**

Nie dotyczy.

**MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH  
BEZPOŚREDNICH**

Saszetka

**1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO I DROGA PODANIA**

**FLUIMUCIL MUKO JUNIOR**

*Acetylcysteinum*

100 mg, granulat do sporządzania roztworu doustnego

Podanie doustne

**2. SPOSÓB PODAWANIA**

Sposób podawania:

Rozpuścić zawartość saszetki w połowie szklanki letniej wody, w razie potrzeby wymieszać łyżką.

Uzyskany roztwór jest gotowy do wypicia.

**3. TERMIN WAŻNOŚCI**

Termin ważności:

**4. NUMER SERII**

Numer serii:

**5. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY  
JEDNOSTEK**

1 g granulatu

**6. INNE**

**Skład:**

1 saszetka (1 g granulatu) zawiera substancję czynną: 100 mg acetylocysteiny.

<Logo zawierające nazwę podmiotu odpowiedzialnego>ZAMBON