

## INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

### TEKTUROWE PUDEŁKO

#### 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Fluxin 500 mg+200 mg+25 mg, granulat do sporządzenia roztworu doustnego w saszetce  
*Paracetamolum + Acidum ascorbicum + Pheniramini maleas*

#### 2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Każda saszetka zawiera 500 mg paracetamolu, 200 mg kwasu askorbowego i 25 mg maleinianu feniraminy.

#### 3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Zawiera sacharozę i etanol. Dodatkowe informacje patrz ulotka.

#### 4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Granulat do sporządzenia roztworu doustnego w saszetce

2 saszetki kod: 5909991250140

4 saszetki kod: 5909991250157

5 saszetek kod: 5909991250164

6 saszetek kod: 5909991250171

8 saszetek kod: 5909991250188

10 saszetek kod: 5909991250195

12 saszetek kod: 5909991250201

14 saszetek kod: 5909991250218

15 saszetek kod: 5909991250225

16 saszetek kod: 5909991250232

18 saszetek kod: 5909991250249

20 saszetek kod: 5909991250256

#### 5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Podanie doustne.

**6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI**

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

**7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE**

Ten lek zawiera paracetamol. Nie należy przyjmować innych leków zawierających paracetamol.

**8. TERMIN WAŻNOŚCI**

EXP

EXP = Termin ważności

**9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA**

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

**10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁĄŚCIWE**

**11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**

**Podmiot odpowiedzialny:**

Dr. Max Pharma s.r.o.

Na Florenci 2116/15

110 00 Praga

Republika Czeska

[logo podmiotu odpowiedzialnego]

**12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU**

Pozwolenie nr: 22814

**13. NUMER SERII**

Lot

Lot = Numer serii

**14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI**

OTC - Lek wydawany bez recepty.

## **15. INSTRUKCJA UŻYCIA**

Łagodzi objawy związane z:

- Przeziębieniem
- Grypą
- Infekcjami górnych dróg oddechowych

Lek ten należy stosować wyłącznie w celu złagodzenia występujących wspólnie następujących objawów: bólu i (lub) gorączki, a jednocześnie kataru, łzawienia oczu lub kichania.

Dla dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 15 lat (o masie ciała 50 kg i powyżej).

Dawkowanie: Jedną saszetkę należy rozpuścić w zimnej lub ciepłej wodzie i stosować 2 lub 3 razy na dobę, z zachowaniem minimum 4-godzinnej przerwy pomiędzy dawkami.  
Nie należy stosować więcej niż 3 saszetki na dobę.

## **16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A**

fluxin

## **17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D**

Nie dotyczy.

## **18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA**

Nie dotyczy.

## INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH

### SASZETKA

#### 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Fluxin 500 mg+200 mg+25 mg, granulat do sporządzenia roztworu doustnego w saszetce  
*Paracetamolum + Acidum ascorbicum + Pheniramini maleas*

#### 2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

Każda saszetka zawiera 500 mg paracetamolu, 200 mg kwasu askorbinowego, 25 mg maleinianu feniraminy.

#### 3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Zawiera sacharozę i etanol. Dodatkowe informacje patrz ulotka.

#### 4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Granulat do sporządzenia roztworu doustnego w saszetce

#### 5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Podanie doustne.  
Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

#### 6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

#### 7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

#### 8. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP

#### 9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

#### 10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

**11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**

Dr. Max Pharma s.r.o.

**12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU**

22814

**13. NUMER SERII**

Lot

**14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI**

**15. INSTRUKCJA UŻYCIA**

Dla dorosłych i młodzieży powyżej 15 lat (o masie ciała 50 kg i powyżej).  
Sposób podawania: Rozpuścić jedną saszetkę w zimnej lub ciepłej wodzie.

**16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE'A**

**17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D**

**18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA**