

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH (LUB BEZPOŚREDNICH)

RODZAJ/TYP - Pudełko tekturowe będzie dostarczane wyłącznie w krajach, w których dostępne będzie urządzenie do odmierzania

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Gaviscon Duo o smaku mięty

Natrii alginas + Natrii hydrogenocarbonas + Calcii carbonas

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Każda 10 ml dawka produktu leczniczego zawiera 500 mg sodu alginianu, 213 mg sodu wodorowęglanu i 325 mg wapnia węglanu.

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Zawiera sól, wapń, metylu parahydroksybenzoesan (E218) i propylu parahydroksybenzoesan (E216) oraz glikol propylenowy (E1520). Więcej informacji znajduje się w ulotce dla pacjenta dołączonej do opakowania.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Zawiesina doustna

Butelka 150 ml numer GTIN: 5900627119244

Butelka 200 ml numer GTIN: 5900627119251

Butelka 250 ml numer GTIN: 5900627119268

Butelka 300 ml numer GTIN: 5900627119275

Butelka 500 ml numer GTIN: 5900627119282

Butelka 600 ml numer GTIN: 5900627119299

<Jeśli dotyczy >

Urządzenie do odmierzania

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Podanie doustnie. Dobrze wstrząsnąć przed użyciem.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

Jeśli objawy nie ustępują po siedmiu dniach, należy skonsultować się z lekarzem. Produkt reprezentuje wysoką zawartość sodu. Więcej informacji znajduje się w ulotce dla pacjenta dołączonej do opakowania. Zawiera wapń. Jeśli pacjentowi zalecono stosowanie diety ubogiej w którykolwiek z tych składników, należy porozmawiać z lekarzem przed przyjęciem leku.

Przed pierwszym użyciem produktu sprawdzić, czy zabezpieczenie na zakrętce nie jest odłamane.

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności (EXP):

Zużyć w ciągu 6 miesięcy od otwarcia.

9. SPECJALNE WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Nie zamrażać ani nie przechowywać w lodówce

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEUŻYTEGO PRODUKTÓW LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWIE

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, które się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Podmiot odpowiedzialny:
Reckitt Benckiser (Poland) S.A.
ul. Okunin 1
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

[logo podmiotu odpowiedzialnego]

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr:

13. NUMER SERII

Numer serii (Lot):

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC - Lek wydawany bez recepty.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Leczenie zgagi, objawów refluksu żołądkowo-przełykowego związanych z nadkwaśnością i niestrawności.

- Smak mięty

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: w przypadku wystąpienia objawów należy przyjmować 10-20 ml po posiłkach i przed snem, do czterech razy a dobę.

Dzieci poniżej 12 lat: nie zaleca się stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

Gaviscon Duo o smaku mięty

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR - KOD 2D
--

<Nie dotyczy>

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR - DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

<Nie dotyczy>