

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH

BLISTER

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Gaviscon duo tab o smaku owoców leśnych
250 mg + 106,5 mg + 187,5 mg, tabletki do rozgryzania i żucia
Natrii alginas + Natrii hydrogenocarbonas + Calcii carbonas

2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Reckitt Benckiser (Poland) S.A.
[logo podmiotu odpowiedzialnego]

3. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP:

4. NUMER SERII

Lot:

5. INNE

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

PUDEŁKO TEKTUROWE

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Gaviscon duo tab o smaku owoców leśnych
250 mg + 106,5 mg + 187,5 mg, tabletki do rozgryzania i żucia
Natrii alginas + Natrii hydrogenocarbonas + Calcii carbonas

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Każda tabletki do rozgryzania i żucia zawiera 250 mg sodu alginianu, 106,5 mg sodu wodorowęglanu i 187,5 mg wapnia węglanu.

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Zawiera azorubicynę, lak glinowy (E 122), aspartam (E 951) i sacharozę. Wysoka zawartość sodu. Dodatkowe informacje patrz ulotka.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Tabletka do rozgryzania i żucia

12 tabletek do rozgryzania i żucia	Kod:
16 tabletek do rozgryzania i żucia	Kod:
24 tabletki do rozgryzania i żucia	Kod:
32 tabletki do rozgryzania i żucia	Kod:
48 tabletek do rozgryzania i żucia	Kod:
60 tabletek do rozgryzania i żucia	Kod:

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Podanie doustne. Dokładnie przeżuć przed połknięciem.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

Jeśli objawy nie ustąpią po 7 dniach, należy skonsultować się z lekarzem. Lek zawiera sól i wapń. Jeśli wymagane jest ograniczenie podaży tych składników w diecie, przed zastosowaniem tego leku należy skonsultować się z lekarzem. Lek o dużej zawartości sodu. W przypadku fenylketonurii, należy pamiętać, że lek jest słodzony aspartamem (E951), będącym źródłem fenylalaniny. Dodatkowe informacje patrz ulotka.

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności (EXP):

9. SPECJALNE WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Podmiot odpowiedzialny:
Reckitt Benckiser (Poland) S.A.
ul. Okunin 1
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

[logo podmiotu odpowiedzialnego]

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr:

13. NUMER SERII

Numer serii (Lot):

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC - Lek wydawany bez recepty.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Leczenie zgagi, kwaśnego refluksu i niestrawności.

- Smak owoców leśnych

- Łagodzi ból i dyskomfort związany ze zgagą, niestrawnością i kwaśnym refluksiem.

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: Po wystąpieniu objawów dwie do czterech tabletek po posiłkach i przed snem (do czterech razy na dobę).

Dzieci w wieku poniżej 12 lat: Nie zaleca się stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

Gaviscon duo tab o smaku owoców leśnych

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D
--

Nie dotyczy.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

Nie dotyczy.