

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH
TEKTUROWE PUDEŁKO 15 g

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

DIP RILIF, (50 mg + 30 mg)/g, żel

Ibuprofenum + Mentholum

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (CZYNNYCH)

1 g żelu zawiera 50 mg ibuprofenu i 30 mg mentolu

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

substancje pomocnicze: karbomer, glikol propylenowy, etanol 96%, diizopropanolaminę, wodę oczyszczoną.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Żel

15 g

KOD 5909990432615

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Sposób stosowania:

Podanie na skórę.

Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: Cienką warstwę żelu DIP RILIF nałożyć na bolesne miejsce i delikatnie wmasować aż do wchłonięcia leku.

Powtarzać nie częściej niż 3 razy na dobę, zachowując co najmniej 4-godzinną przerwę w stosowaniu.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C
Okres ważności po pierwszym otwarciu tuby: 3 miesiące.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

The Mentholatum Company (Ireland) Limited
Ground Floor
71 Lower Baggot Street
Dublin
D02 P593
Irlandia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do EGIS Polska Sp.
Z o.o.
ul. Komitetu Obrony Robotników 45D, 02-146 Warszawa, tel. 22 417 92 00

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 4326

13. NUMER SERII

Numer serii

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC – lek wydawany bez recepty.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Lek przeciwbólowy i przeciwzapalny

Wskazania:

Lek do miejscowego leczenia przeciwbólowego i przeciwzapalnego:

- Bóle reumatyczne (w tym zwyrodnieniowe i zapalne bóle stawów)
- Bóle pleców
- Bóle mięśniowe
- Ból i obrzęk wskutek uszkodzeń powysiłkowych, urazów stawów z naderwaniem więzadeł (skręcenia stawów), kontuzji sportowych
- Bóle w tkance włóknistej, ścięgnach i więzadłach
- Lumbago (postrzał)

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE'A

DIP RILIF (50 mg + 30 mg)/g żel

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH
TEKTUROWE PUDEŁKO 30 g, 50 g, 100 g

71. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

DIP RILIF, (50 mg + 30 mg)/g, żel

Ibuprofenum + Mentholum

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (CZYNNYCH)

1 g żelu zawiera 50 mg ibuprofenu i 30 mg mentolu

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

substancje pomocnicze: karbomer, glikol propylenowy, etanol 96%, diizopropanolaminę, wodę oczyszczoną.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Żel	
30 g	KOD 5909990432622
50 g	KOD 5909990432639
100 g	KOD 5909990432646

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Sposób stosowania:

Podanie na skórę.

Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: Cienką warstwę żelu DIP RILIF nałożyć na bolesne miejsce i delikatnie wmasować aż do wchłonięcia leku.

Powtarzać nie częściej niż 3 razy na dobę, zachowując co najmniej 4-godzinną przerwę w stosowaniu.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C
Okres ważności po pierwszym otwarciu tuby: 3 miesiące.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE**11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**

The Mentholatum Company (Ireland) Limited
Ground Floor
71 Lower Baggot Street
Dublin
D02 P593
Irlandia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do EGIS Polska Sp. z o.o.
ul. Komitetu Obrony Robotników 45D, 02-146 Warszawa, tel. 22 417 92 00

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 4326

13. NUMER SERII

Numer serii

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC - lek wydawany bez recepty.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Lek przeciwbólowy i przeciwzapalny

W miejscu zmienionym chorobowo łagodzi ból i zmniejsza obrzęk. Zmniejsza bóle mięśniowo-stawowe.

Wskazania:

Lek do miejscowego leczenia przeciwbólowego i przeciwzapalnego:

- Bóle reumatyczne (w tym zwyrodnieniowe i zapalne bóle stawów)
- Bóle pleców
- Bóle mięśniowe
- Ból i obrzęk wskutek uszkodzeń powysiłkowych, urazów stawów z naderwaniem więzadeł (skręcenia stawów), kontuzji sportowych
- Bóle w tkance włóknistej, ścięgnach i więzadłach

- Lumbago (postrzał)

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE'A

DIP RILIF (50 mg + 30 mg)/g żel

**MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH
BEZPOŚREDNICH**

{Etykieta na tubę} 15 g, 30 g, 50 g, 100 g

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO I DROGAPODANIA

DIP RILIF, (50 mg + 30 mg)/g, żel

Ibuprofenum + Mentholum

Podanie na skórę.

2. SPOSÓB PODAWANIA

Cienką warstwę żelu nałożyć na bolesne miejsce i delikatnie wmasować aż do wchłonięcia leku. Powtarzać nie częściej niż 3 razy na dobę, zachowując co najmniej 4-godzinną przerwę w stosowaniu.

3. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności: na zgrzewie tuby.

4. NUMER SERII

Numer serii: na zgrzewie tuby.

**5. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB
LICZBY JEDNOSTEK**

15 g
30 g
50 g
100 g

6. INNE

Lek przeciwbólowy i przeciwzapalny

Colep Laupheim GmbH & Co. KG,

Okres ważności po pierwszym otwarciu tuby: 3 miesiące.