

**MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH**

**BLISTER**

**1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO**

**Gripex MAX**

500 mg + 30 mg + 15 mg

tabletki powlekane

*Paracetamolum + Pseudoephedrini hydrochloridum + Dextromethorphan hydrobromidum*

**2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**

US Pharmacia Sp. z o.o.

**3. TERMIN WAŻNOŚCI**

{słowo EXP wraz z ciągiem cyfr określających termin ważności zostaną wytłoczone lub nadrukowane}

**4. NUMER SERII**

{słowo Lot wraz z ciągiem znaków określających nr serii zostaną wytłoczone lub nadrukowane}

**5. INNE**

## INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

### PUDEŁKO TEKTUROWE NA BLISTRY

#### 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

**Gripex MAX**, (500 mg + 30 mg + 15 mg), tabletki powlekane  
*Paracetamolum + Pseudoephedrini hydrochloridum + Dextromethorphan hydrobromidum*

#### 2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

**Skład:** 1 tabletkę powlekana zawiera *substancje czynne*:

- paracetamol 500 mg
- pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg
- dekstrometorfanu bromowodorek 15 mg

#### 3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

oraz *substancje pomocnicze*, w tym tartrazynę, lak (E 102).

#### 4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| 6 tabletek powlekanych  | kod EAN: 5909991053215 |
| 6 tabletek powlekanych  | kod EAN: 5909991053222 |
| 10 tabletek powlekanych | kod EAN: 5909991053239 |
| 12 tabletek powlekanych | kod EAN: 5909991053246 |
| 20 tabletek powlekanych | kod EAN: 5909990068456 |

#### 5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

#### 6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

#### 7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

##### Ostrzeżenia

**Lek zawiera paracetamol.** Ze względu na ryzyko uszkodzenia wątroby w czasie stosowania leku nie należy:

- przyjmować innych leków zawierających paracetamol,
- pić alkoholu.

W razie zastosowania dawki większej niż zalecana natychmiast skontaktować się z lekarzem, nawet jeśli nie wystąpiły żadne objawy, ponieważ może dojść do zagrażającego życiu uszkodzenia wątroby.

**8. TERMIN WAŻNOŚCI**

Termin ważności:

**9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA****Przechowywanie**

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

**10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE****11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO****Podmiot odpowiedzialny**

US Pharmacia Sp. z o.o.

ul. Ziębicka 40

50-507 Wrocław

{tel.} 22 543 60 00

{logotyp podmiotu}

**12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU**

Pozwolenie nr: 10532

**13. NUMER SERII**

Numer serii:

**14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI**

OTC - Lek wydawany bez recepty.

**15. INSTRUKCJA UŻYCIA****Wskazania**

Gorączka

Ból głowy

Katar

Kaszel suchy

Ból gardła

NASILONE OBJAWY PRZEZIĘBIENIA I GRYPY

**Dawkowanie i droga podania****Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat:**

- od 1 do 2 tabletek, 3-4 razy na dobę,
- maksymalna dawka dobową: 8 tabletek.

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| <b>16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE'A</b> |
|-------------------------------------------------|

gripex max