

**MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB
OPAKOWANIACH FOLIOWYCH**

BLISTRY

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Hemkortin-HC

2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Polmex Pharma Biniński sp. k.

3. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP: *[wytłaczane na blistrze]*

4. NUMER SERII

LOT: *[wytłaczane na blistrze]*

5. INNE



INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

PUDEŁKO TEKTUROWE

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Hemkortin-HC, 10 mg + 10 mg, czopki

Hydrocortisoni acetat + Zinci sulfas

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Skład Jeden czopek zawiera:

10 mg octanu hydrokortyzonu,

10 mg jednowodnego siarczanu cynku

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

oraz substancję pomocniczą – tłuszcz twardy (Witepsol)

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

12 czopków Kod EAN: 5909990353514

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Podanie doodbytnicze

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności (EXP):

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Polmex Pharma Biniński sp. k., ul. Pokorna 2 lok. 1027, 00-199 Warszawa
[logo Polmex Pharma]

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie Nr: R/3535

13. NUMER SERII

Nr serii (LOT):

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC - Lek wydawany bez recepty.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Wskazania. Leczenie hemoroidów, stanów zapalnych odbytu, szczeliny odbytu, świądu odbytu. Można stosować w okresie przed- i pooperacyjnym.

Dawkowanie. U dorosłych zwykle stosuje się jeden czopek rano, jeden wieczorem oraz po każdym wypróżnieniu. Stosować przez trzy do czterech dni, do ustąpienia stanu zapalnego.

Stosowanie u dzieci w wieku poniżej 12 lat jest przeciwwskazane.

Sposób stosowania. Rozerwać opakowanie czopka, wyjąć czopek i wsunąć go delikatnie w odbyt zaostrzonym końcem.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

Hemkortin-HC czopki