

**INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH**

**PUDEŁKO TEKTUROWE**

**1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO**

Hitaxa Fast, 5 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej  
*Desloratadinum*

**2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ**

**ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ:**

Każda tabletki ulegająca rozpadowi w jamie ustnej zawiera **5 mg** desloratadyny.

**3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH**

Zawiera również aspartam (E 951).

**4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA**

tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej

10 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej

Kod EAN: 5909990981328

**5. SPOSÓB I DROGA PODANIA**

**SPOSÓB I DROGA PODANIA:** Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

**6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI**

**SPOSÓB PRZECHOWYWANIA:** Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

**7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE**

**8. TERMIN WAŻNOŚCI**

Termin ważności (EXP):

**9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA**

**10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE**

**11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**

**PODMIOT ODPOWIEDZIALNY:**

Adamed Pharma S.A.  
Pieńków, ul. M. Adamkiewicza 6A  
05-152 Czosnów

(Logo Adamed)

**12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU**

**POZWOLENIE NR:** 20224

**13. NUMER SERII**

Nr serii (Lot):

**14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI**

**OTC** – Lek wydawany bez recepty.

**15. INSTRUKCJA UŻYCIA**

LEK PRZECIWAALERGICZNY

**WSKAZANIA:** Łagodzenie objawów związanych z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa i pokrzywką: katar, kichanie, świąd podniebienia, łzawienie, swędzenie i zaczerwienienie oczu, świąd skóry.

- Bez konieczności popijania.
- Dla młodzieży w wieku od 12 lat i dorosłych.
- Przyjmować raz na dobę.

Smak Tutti-Frutti

**DAWKOWANIE:** Dorośli i młodzież w wieku 12 lat i więcej: jedna tabletką ulegającą rozpadowi w jamie ustnej 5 mg raz na dobę.  
Tabletki zażyć natychmiast po otwarciu blistra.  
Stosować zgodnie z informacją w ulotce dołączonej do opakowania.

**16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A**

hitaxa fast 5 mg

**17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D**

Nie dotyczy.

**18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA**

Nie dotyczy.

**MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH**

**BLISTER**

**1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO**

Hitaxa Fast, 5 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej

*Desloratadinum*

**2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**

(Logo Adamed)

**3. TERMIN WAŻNOŚCI**

EXP:

**4. NUMER SERII**

Lot:

**5. INNE**