

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

PUDEŁKO TEKSTUROWE

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Hitaxa fast junior, 2,5 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej
Desloratadinum

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ:

Każda tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej zawiera **2,5 mg** desloratadyny.

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Zawiera również aspartam (E 951).

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej

10 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej

Kod EAN: 5909990981298

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

SPOSÓB I DROGA PODANIA: Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. Stosować zgodnie z informacją podaną na opakowaniu.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

SPOSÓB PRZECHOWYWANIA: Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności (EXP):

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY:

Adamed Pharma S.A.
Pieńków, ul. M. Adamkiewicza 6A
05-152 Czosnów

(Logo Adamed)

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

POZWOLENIE NR: 20223

13. NUMER SERII

Nr serii (Lot):

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC – Lek wydawany bez recepty.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

LEK PRZECIWALERGICZNY

WSKAZANIA: Łagodzenie objawów związanych z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa i pokrzywką: katar, kichanie, łzawienie, swędzenie i zaczerwienienie oczu, świąd podniebienia, świąd skóry.

- Bez konieczności popijania.
- Dla dzieci w wieku od 6 lat i dorosłych.
- Przyjmować raz na dobę.

SMAK TUTTI-FRUTTI

DAWKOWANIE: Dzieci w wieku od 6 do 11 lat: jedna tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej raz na dobę. Dorośli i młodzież w wieku 12 lat i więcej: dwie tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej raz na dobę. Tabletki zażyć natychmiast po otwarciu blistra. Stosować zgodnie z informacją w ulotce dołączonej do opakowania.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

hitaxa fast junior 2,5 mg

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D
--

Nie dotyczy.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

Nie dotyczy.

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH

BLISTER

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Hitaxa fast junior, 2,5 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej

Desloratadinum

2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

(Logo Adamed)

3. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP:

4. NUMER SERII

Lot:

5. INNE