

**INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH****PUDEŁKO TEKSTUROWE****1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO**

**IBUM FORTE, 200 mg/5 ml, zawiesina doustna**  
*Ibuprofenum*

**2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ****Skład**

5 ml zawiesiny zawiera:  
*Substancję czynną:* ibuprofen 200 mg,

**3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH**

*Substancje pomocnicze:* maltitol ciekły (E 965), sodu benzoesan (E 211), aromat truskawkowy naturalny AR 2157 (zawiera naturalne substancje aromatyczne oraz glikol propylenowy E 1520) i inne.

**4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA**

Zawiesina doustna  
100 g

Kod: 5909991248116

**5. SPOSÓB I DROGA PODANIA**

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

**Sposób i droga podania**

Podanie doustne.

Przed użyciem butelkę należy wstrząsnąć.

<b>Wiek dziecka (masa ciała dziecka)</b>	<b>Dawka jednorazowa</b>	<b>Maksymalna dawka dobową</b>
3-6 miesięcy (5-7,6 kg)	1,25 ml	3 razy po 1,25ml
6-12 miesięcy (7,7-9 kg)	1,25 ml	3-4 razy po 1,25 ml
1-3 lata (10-15 kg)	2,5 ml	3 razy po 2,5 ml
4-6 lat (16-20 kg)	3,75 ml	3 razy po 3,75 ml
7-9 lat (21-29 kg)	5 ml	3 razy po 5 ml
10-12 lat (30-40 kg)	7,5 ml	3 razy po 7,5 ml
powyżej 40 kg	7,5-10 ml	3-4 razy po 7,5 ml

Lek należy podawać w odstępach co najmniej sześciogodzinnych. Nie należy stosować większej dawki leku niż zalecana.

Do opakowania dołączona jest strzykawka doustna.

Szczegółowa instrukcja obsługi strzykawki znajduje się w ulotce dla pacjenta, dołączonej do opakowania.

Lek nie zawiera cukru i etanolu. Może być stosowany przez osoby chore na cukrzycę (5 ml produktu IBUM FORTE zawiera 1,119 g maltitolu ciekłego, co odpowiada około 0,07 wymiennika węglowodanowego).

**6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI**

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

**7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE**

**8. TERMIN WAŻNOŚCI**

**Termin ważności**

Okres ważności po pierwszym otwarciu: 6 miesięcy.

**9. SPECJALNE WARUNKI PRZECHOWYWANIA**

**Warunki przechowywania**

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w zamkniętym oryginalnym opakowaniu.

**10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE**

**11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**

**Podmiot odpowiedzialny**

„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A.  
51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

{Logo podmiotu odpowiedzialnego}

**12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU**

Pozwolenie nr 22798

**13. NUMER SERII**

Numer serii

**14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI**

OTC - Lek wydawany bez recepty.

## **15. INSTRUKCJA UŻYCIA**

**o smaku truskawkowym**

- przeciwgorączkowy
- przeciwbólowy
- przeciwzapalny

**od 3 miesięcy**

dołączona strzykawka doustna

## **16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A**

ibum forte 200 mg/5 ml zawiesina doustna

## **17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D**

Nie dotyczy.

## **18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA**

Nie dotyczy.

**INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH****BUTELKA ZE SZKŁA BRUNATNEGO****1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO**

**IBUM FORTE, 200 mg/5 ml, zawiesina doustna**  
*Ibuprofenum*

**2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ****Skład**

5 ml zawiesiny zawiera 200 mg ibuprofenu.

**3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH****4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA**

Zawiesina doustna

100 g

**5. SPOSÓB I DROGA PODANIA**

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

**Sposób i droga podania**

Podanie doustne.

Przed użyciem butelkę należy wstrząsnąć.

<b>Wiek dziecka (masa ciała dziecka)</b>	<b>Dawka jednorazowa</b>	<b>Maksymalna dawka dobową</b>
3-6 miesięcy (5-7,6 kg)	1,25 ml	3 razy po 1,25 ml
6-12 miesięcy (7,7-9 kg)	1,25 ml	3-4 razy po 1,25 ml
1-3 lata (10-15 kg)	2,5 ml	3 razy po 2,5 ml
4-6 lat (16-20 kg)	3,75 ml	3 razy po 3,75 ml
7-9 lat (21-29 kg)	5 ml	3 razy po 5 ml
10-12 lat (30-40 kg)	7,5 ml	3 razy po 7,5 ml
powyżej 40 kg	7,5-10 ml	3-4 razy po 7,5 ml

Lek należy podawać w odstępach co najmniej sześciogodzinnych. Nie należy stosować większej dawki leku niż zalecana.

Do opakowania dołączona jest strzykawka doustna.

Szczegółowa instrukcja obsługi strzykawki znajduje się w ulotce dla pacjenta, dołączonej do opakowania.

**6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI**

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

**7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE****8. TERMIN WAŻNOŚCI****Termin ważności**

Okres ważności po pierwszym otwarciu: 6 miesięcy.

Wpisz datę pierwszego otwarcia:

**9. SPECJALNE WARUNKI PRZECHOWYWANIA****Warunki przechowywania**

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w zamkniętym oryginalnym opakowaniu.

**10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE****11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO****Podmiot odpowiedzialny**

PPF HASCO-LEK S.A.

51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

{Logo podmiotu odpowiedzialnego}

**12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU**

Pozwolenie nr 22798

**13. NUMER SERII**

Numer serii

**14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI****15. INSTRUKCJA UŻYCIA****o smaku truskawkowym**

- przeciwgorączkowy
- przeciwbólowy
- przeciwzapalny

**Od 3 miesięcy**

**16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE'A**

**17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D**

**18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA**