

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH**PUDEŁKO TEKTUROWE****1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO**

Ibuprofen Zentiva, 200 mg, tabletki powlekane
Ibuprofenum

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

Każda tabletki powlekana zawiera 200 mg ibuprofenu.

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH**4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA**

Tabletka powlekana

10 tabletek powlekanych kod:

12 tabletek powlekanych kod:

20 tabletek powlekanych kod:

24 tabletki powlekane kod:

50 tabletek powlekanych kod:

100 tabletek powlekanych kod:

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Podanie doustne.
Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŻELI KONIECZNE**8. TERMIN WAŻNOŚCI**

EXP
EXP = termin ważności

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE**11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**

Zentiva, k.s.
U kabelovny 130
Dolní Měcholupy
102 37 Praga 10
Republika Czeska

(logo podmiotu odpowiedzialnego)

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr:

13. NUMER SERII

Lot
Lot = numer serii

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC - lek wydawany bez recepty

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Dorośli i młodzież (w wieku 12-18 lat, 40 kg i więcej): Ibuprofen Zentiva jest stosowany w krótkotrwałym objawowym leczeniu łagodnego do umiarkowanego bólu, takiego jak bóle głowy (w tym migrenowy ból głowy), bóle pleców oraz bóle mięśni i stawów, ból zęba, ból miesiączkowy oraz ostry ból i gorączka związane z przeziębieniem.

Dzieci w wieku od 6 do 12 lat (powyżej 20 kg) można leczyć tabletkami leku Ibuprofen Zentiva, 200 mg, podczas ostrych dolegliwości bólowych i gorączki związanej z przeziębieniem.

Dzieci od 20 kg masy ciała (w wieku 6-12 lat):

Dzieci o masie ciała 20-29 kg (w wieku 6-9 lat): Jedna tabletką, w razie potrzeby 1-3 razy na dobę, w odstępach co najmniej 4 do 6 godzin pomiędzy dawkami. Maksymalna liczba tabletek nie powinna przekraczać 3 tabletek w ciągu jednego dnia.

Dzieci o masie ciała 30-40 kg (w wieku 10-12 lat): Jedna tabletką 1-4 razy na dobę w odstępach co najmniej 4 do 6 godzin pomiędzy dawkami. Maksymalna liczba tabletek nie powinna przekraczać 4 tabletek w ciągu doby.

Dorośli i młodzież od 40 kg (w wieku powyżej 12 lat):

Jedna lub dwie tabletki podawane w pojedynczej dawce lub 3-4 razy na dobę w odstępie co najmniej 4 do 6 godzin. Maksymalna dobową dawką nie powinna przekraczać 6 tabletek.

Migrenowe bóle głowy - przyjmować dwie tabletki 1-3 razy na dobę w odstępie co najmniej 4 do 6 godzin pomiędzy dawkami.

Ból miesiączkowy - przyjmować jedną lub dwie tabletki przy pierwszych oznakach bólu związanego z miesiączką 1 do 3 razy na dobę w odstępie co najmniej 4 do 6 godzin pomiędzy dawkami.

Należy skonsultować się z lekarzem, jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią w ciągu 3 dni od wystąpienia gorączki lub migrenowego bólu głowy lub 5 dni bólu u dorosłych. Należy skonsultować się z lekarzem, jeśli dziecko lub nastolatek muszą stosować Ibuprofen Zentiva dłużej niż 3 dni lub jeśli objawy nasilą się.

Wyższe dawki niż zalecane mogą stanowić poważne zagrożenie. Nie należy stosować jednocześnie różnych rodzajów leków przeciwbólowych bez recepty.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE'A

ibuprofen zentiva 200 mg tabletką powlekana

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Nie dotyczy

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

Nie dotyczy

MINIMUM INFORMACJI, ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH

BLISTER

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Ibuprofen Zentiva, 200 mg, tabletki powlekane
Ibuprofenum

2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

(logo podmiotu odpowiedzialnego)

3. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP

4. NUMER SERII

Lot

5. INNE

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

PUDEŁKO TEKTUROWE

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Ibuprofen Zentiva, 400 mg, tabletki powlekane
Ibuprofenum

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

Każda tabletki powlekana zawiera 400 mg ibuprofenu.

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Tabletka powlekana

10 tabletek powlekanych kod:

12 tabletek powlekanych kod:

20 tabletek powlekanych kod:

24 tabletki powlekane kod:

30 tabletek powlekanych kod:

36 tabletek powlekanych kod:

40 tabletek powlekanych kod:

48 tabletek powlekanych kod:

50 tabletek powlekanych kod:

100 tabletek powlekanych kod:

250 tabletek powlekanych kod:

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŻELI KONIECZNE

8. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP
EXP = termin ważności

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Zentiva, k.s.
U kabelovny 130
Dolní Měcholupy
102 37 Praga 10
Republika Czeska

(logo podmiotu odpowiedzialnego)

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr:

13. NUMER SERII

Lot
Lot = numer serii

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC - lek wydawany bez recepty

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Ibuprofen Zentiva jest stosowany w krótkotrwałym objawowym leczeniu łagodnego do umiarkowanego bólu, takiego jak bóle głowy (w tym migrenowy ból głowy), bóle pleców oraz bóle mięśni i stawów, ból zęba, ból miesiadczy oraz ostry ból i gorączka związane z przeziębieniem.

Dorośli i młodzież od 40 kg (w wieku powyżej 12 lat):

Jedna tabletkę podawana 3-4 razy na dobę w odstępie co najmniej 4 do 6 godzin. Maksymalna dobową dawką nie powinna przekraczać 3 tabletek.

Migrenowe bóle głowy - przyjmować jedną tabletkę 1-3 razy na dobę w odstępie co najmniej 4 do 6 godzin pomiędzy dawkami.

Ból miesiączkowy - przyjmować jedną tabletkę przy pierwszych oznakach bólu związanego z miesiączką 1 do 3 razy na dobę w odstępie co najmniej 4 do 6 godzin pomiędzy dawkami.

Należy skonsultować się z lekarzem, jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią w ciągu 3 dni od wystąpienia gorączki lub migrenowego bólu głowy lub 5 dni bólu u dorosłych. W przypadku nastolatków należy skonsultować się z lekarzem, jeśli objawy nasilą się lub w ciągu 3 dni nie nastąpi poprawa.

Wyższe dawki niż zalecane mogą stanowić poważne zagrożenie. Nie należy stosować jednocześnie różnych rodzajów leków przeciwbólowych bez recepty.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE'A

ibuprofen zentiva 400 mg tabletkę powlekana

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D
--

Nie dotyczy

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

Nie dotyczy

MINIMUM INFORMACJI, ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH

BLISTER

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Ibuprofen Zentiva, 400 mg, tabletki powlekane
Ibuprofenum

2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

(logo podmiotu odpowiedzialnego)

3. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP

4. NUMER SERII

Lot

5. INNE