

**INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH**  
**PUDEŁKO TEKSTUROWE**

**1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO**

**IBUPROM ULTRAMAX**

600 mg, tabletki powlekane

*Ibuprofenum*

**2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ**

**Skład:** Każda tabletki powlekana zawiera 600 mg ibuprofenu

**3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH**

oraz substancje pomocnicze, w tym laktozę oraz glikol propylenowy. Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

**4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA**

Tabletki powlekane

10 tabletek powlekanych      Kod 5909991425371

**5. SPOSÓB I DROGA PODANIA**

**Sposób stosowania i droga podania:**

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Podanie doustne.

**6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI**

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

**7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE**

**Ostrzeżenia:** Nie stosować z innymi lekami zawierającymi ibuprofen.

**8. TERMIN WAŻNOŚCI**

Termin ważności (EXP):

## 9. SPECJALNE WARUNKI PRZECHOWYWANIA

**Przechowywanie:** Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

## 10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

## 11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

**Podmiot odpowiedzialny:**

US Pharmacia Sp. z o.o.,  
ul. Ziębicka 40,  
50-507 Wrocław

(logo podmiotu odpowiedzialnego)

## 12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 24295

## 13. NUMER SERII

Numer serii (Lot):

## 14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC - Lek wydawany bez recepty.

## 15. INSTRUKCJA UŻYCIA

**Wskazania:** Do krótkotrwałego stosowania.

Ostre i umiarkowane bóle:

- głowy (w tym migrena)
- zębów
- mięśniowe i kostne
- pleców
- pourazowe
- pooperacyjne
- nerwobóle
- bóle miesiączkowe.

Działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne, przeciwgorączkowe.

**Dorośli:** zalecana dawka to 600 mg ibuprofenu (1 tabletkę) jednorazowo.

W razie potrzeby dawkę jednorazową 600 mg (1 tabletkę) można powtórzyć, zachowując odstęp 6 - 8 godzin.

Maksymalna dawka dobową, bez konsultacji z lekarzem nie powinna przekraczać 1200 mg (2 tabletki).

Do stosowania u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 18 lat.

**Maksymalnie 2 tabletki na dobę.**

**16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE'A**

ibuprom ultramax

**17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D**

Nie dotyczy.

**18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA**

Nie dotyczy.