

**INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH****PUDEŁKO TEKTUROWE zawierające blister(y)****1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO****IBUPROM ZATOKI**

200 mg + 30 mg tabletki powlekane

*Ibuprofenum + Pseudoephedrini hydrochloridum***2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH****Skład:** 1 tabletkę zawiera: ibuprofen 200 mg, pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg**3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH**

oraz substancje pomocnicze m.in. sacharozę i lak żółcieni pomarańczowej (E110).

**4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA**

Tabletka powlekana

6 tabletek            kod: 5909990965052

10 tabletek        kod: 5907377139546

12 tabletek        kod: 5909990965021

20 tabletek        kod: 5907377139553

24 tabletki        kod: 5909990965038

**5. SPOSÓB I DROGA PODANIA****6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI**

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

**7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE****Ostrzeżenia:**

Nie stosować z innymi lekami zawierającymi ibuprofen oraz z innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi.

**8. TERMIN WAŻNOŚCI**

Termin ważności (EXP):

**9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA**

**Przechowywanie:** Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

**10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE****11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO****Podmiot odpowiedzialny:**

US Pharmacia Sp. z o.o.,  
ul. Ziębicka 40,  
50-507 Wrocław

[logotyp podmiotu odpowiedzialnego]

**12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU**

Pozwolenie nr 9650

**13. NUMER SERII**

Numer serii (Lot):

**14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI**

OTC - Lek wydawany bez recepty.

**15. INSTRUKCJA UŻYCIA****Wskazania:**

- Objawy zapalenia zatok
- Ból i niedrożność zatok
- Bóle głowy
- Katar
- Bóle mięśniowe
- Ból gardła
- Gorączka

*LEK NA BÓL I NIEDROŻNOŚĆ ZATOK*

**Dawkowanie i droga podania:**

Podanie doustne. Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

**Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat:** W doraźnym leczeniu 1 do 2 tabletek co 4 godziny.

Nie należy stosować więcej niż 6 tabletek na dobę.  
Leku nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

<b>16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE'A</b>
---

ibuprom zatoki