

**INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH**  
**TEKTUROWE PUDEŁKO**

**1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO**

**IBUPROM ZATOKI MAX**

400 mg + 60 mg, tabletki powlekane

*Ibuprofenum + Pseudoephedrini hydrochloridum,*

**2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ**

**Skład:** 1 tabletkę powlekaną zawiera jako substancje czynne: ibuprofen 400 mg, pseudoefedryny chlorowodorek 60 mg

**3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH**

oraz substancje pomocnicze w tym czerwień koszenilową (E 124).

**4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA**

Tabletka powlekaną

6 tabletek      kod 5903031289336

10 tabletek    kod 5903031289350

12 tabletek    kod 5903031289343

**5. SPOSÓB I DROGA PODANIA**

**Dawkowanie i droga podania:**

Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

**6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI**

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

**7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE**

**Ostrzeżenia:**

Nie stosować z innymi lekami zawierającymi ibuprofen oraz innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi.

**8. TERMIN WAŻNOŚCI**

Termin ważności (EXP):

**9. SPECJALNE WARUNKI PRZECHOWYWANIA**

**Przechowywanie:** Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

**10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE****11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO****Podmiot odpowiedzialny:**

US Pharmacia Sp. z o.o.,  
ul. Ziębicka 40,  
50-507 Wrocław

{logo podmiotu odpowiedzialnego}

**12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU**

Pozwolenie nr 26598

**13. NUMER SERII**

Numer serii (Lot):

**14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI**

OTC - Lek wydawany bez recepty.

**15. INSTRUKCJA UŻYCIA**

Lek na ból i niedrożność zatok

**Wskazania:**

- objawy zapalenia zatok
- ból i niedrożność zatok
- bóle głowy
- katar
- bóle mięśniowe
- ból gardła
- gorączka

**Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat:** W doraźnym leczeniu 1 tabletką co 6-8 godzin po

posiłkach. Nie należy stosować więcej niż 3 tabletki na dobę. Leku nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat

**16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE'A**

ibuprom zatoki max

**17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D**

Nie dotyczy.

**18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA**

Nie dotyczy.