

**INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH****ETYKIETA NA POJEMNIK Z HDPE****1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO**

IbuTeva, 200 mg, tabletki powlekane

*Ibuprofenum*

**2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ**

Każda tabletki powlekana zawiera 200 mg ibuprofenu.

**3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH****4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA**

30 tabletek powlekanych

Kod

5	9	0	9	9	9	0	7	2	6	0	4	2
5	9	0	9	9	9	0	7	2	6	0	5	9

50 tabletek powlekanych

Kod

**5. SPOSÓB I DROGA PODANIA**

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Podanie doustne

**6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI**

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

**7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE****8. TERMIN WAŻNOŚCI**

Termin ważności (EXP):

**9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA****10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE**

**11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.  
ul. Emilii Plater 53  
00-113 Warszawa  
[logo]

**12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU**

Pozwolenie nr 15886

**13. NUMER SERII**

Nr serii (Lot) :

**14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI**

<OTC - Lek wydawany bez recepty.>

**15. INSTRUKCJA UŻYCIA**

- <
- ból głowy
  - migrenowy ból głowy
  - ból zębów
  - bolesne miesiączkowanie
  - gorączka>

<W przypadku braku opakowania zewnętrznego::

Tutaj otworzyć.

Informacja dotycząca stosowania leku, dawkowania i przeciwwskazań jest pod spodem etykiety w ulotce dla pacjenta.>

**16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A**

IbuTeva

**17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D**

<Nie dotyczy>

**18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA**

<Nie dotyczy>

**INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH**  
**PUDEŁKO TEKSTUROWE NA POJEMNIK**

**1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO**

IbuTeva, 200 mg, tabletki powlekane

*Ibuprofenum*

**2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ**

Każda tabletki powlekana zawiera 200 mg ibuprofenu.

**3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH**

**4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA**

30 tabletek powlekanych

Kod

5	9	0	9	9	9	0	7	2	6	0	4	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

50 tabletek powlekanych

Kod

5	9	0	9	9	9	0	7	2	6	0	5	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**5. SPOSÓB I DROGA PODANIA**

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Podanie doustne

**6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI**

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

**7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE**

**8. TERMIN WAŻNOŚCI**

Termin ważności (EXP):

**9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA**

**10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE**

## 11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.  
ul. Emilii Plater 53  
00-113 Warszawa  
[logo]

## 12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 15886

## 13. NUMER SERII

Nr serii (Lot):

## 14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC - Lek wydawany bez recepty.

## 15. INSTRUKCJA UŻYCIA

<

- ból głowy
- migrenowy ból głowy
- ból zębów
- bolesne miesiączkowanie
- gorączka

*Do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat:*

### **Ból łagodny do umiarkowanego i gorączka**

1 do 2 tabletek podawane w pojedynczej dawce lub 3 do 4 razy na dobę co 4 do 6 godzin.  
Maksymalna dawka dobową: 6 tabletek (1200 mg).

### **Migrenowy ból głowy:**

2 tabletki podawane w pojedynczej dawce, jeśli konieczne 2 tabletki, co 4 do 6 godzin.  
Maksymalna dawka dobową: 6 tabletek (1200mg).

### **Bolesne miesiączkowanie:**

1 do 2 tabletek, 1 do 3 razy na dobę jeśli konieczne, co 4 do 6 godzin. Maksymalna dawka dobową: 6 tabletek (1200mg).

Tabletkę należy popić szklanką wody. Tabletkę należy przyjmować z posiłkiem i nie na pusty żołądek.

Lek **NIE** jest przeznaczony dla dzieci w wieku poniżej 6 lat.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, kiedy **NIE** przyjmować tego leku i kiedy zachować szczególną ostrożność, należy przeczytać ulotkę.

Tylko do krótkotrwałego stosowania: nie dłużej niż 7 dni u dorosłych i 3 dni u dzieci i młodzieży bez porady lekarza. Należy zgłosić się do lekarza, jeśli objawy utrzymują się lub się nasilają.>

**16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE'A**

IbuTeva

**17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D**

Nie dotyczy

**18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA**

Nie dotyczy

**INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH****PUDEŁKO TEKTUROWE NA BLISTRY****1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO**

IbuTeva, 200 mg, tabletki powlekane

*Ibuprofenum*

**2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ**

Każda tabletki powlekana zawiera 200 mg ibuprofenu.

**3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH****4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA**

6 tabletek powlekanych	Kod	5	9	0	9	9	9	0	7	2	6	0	2	8
10 tabletek powlekanych	Kod	5	9	0	9	9	9	0	7	2	6	0	3	5
12 tabletek powlekanych	Kod	5	9	0	9	9	9	1	0	8	7	9	4	4
24 tabletki powlekane	Kod	5	9	0	9	9	9	1	0	8	7	9	5	1

**5. SPOSÓB I DROGA PODANIA**

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Podanie doustne

**6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI**

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

**7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE****8. TERMIN WAŻNOŚCI**

Termin ważności (EXP):

**9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA****10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE**

## 11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.  
ul. Emilii Plater 53  
00-113 Warszawa  
[logo]

## 12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 15886

## 13. NUMER SERII

Nr serii (Lot):

## 14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC - Lek wydawany bez recepty.

## 15. INSTRUKCJA UŻYCIA

- ból głowy
- migrenowy ból głowy
- ból zębów
- bolesne miesiączkowanie
- gorączka

*Do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat:*

### **Ból łagodny do umiarkowanego i gorączka**

1 do 2 tabletek podawane w pojedynczej dawce lub 3 do 4 razy na dobę co 4 do 6 godzin..

Maksymalna dawka dobową: 6 tabletek (1200 mg).

### **Migrenowy ból głowy:**

2 tabletki podawane w pojedynczej dawce, jeśli konieczne 2 tabletki co 4 do 6 godzin.

Maksymalna dawka dobową: 6 tabletek (1200mg).

### **Bolesne miesiączkowanie:**

1 do 2 tabletek, 1 do 3 razy na dobę jeśli konieczne, co 4 do 6 godzin. Maksymalna dawka dobową: 6 tabletek (1200mg).

Tabletkę należy popić szklanką wody. Tabletkę należy przyjmować z posiłkiem i nie na pusty żołądek.

Lek **NIE** jest przeznaczony dla dzieci w wieku poniżej 6 lat.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, kiedy **NIE** przyjmować tego leku i kiedy zachować szczególną ostrożność, należy przeczytać ulotkę.

Tylko do krótkotrwałego stosowania: nie dłużej niż 7 dni u dorosłych i 3 dni u dzieci i młodzieży bez porady lekarza. Należy zgłosić się do lekarza, jeśli objawy utrzymują się lub się nasilają.

**16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE'A**

IbuTeva

**17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D**

Nie dotyczy

**18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA**

Nie dotyczy

**MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH**

**BLISTER**

**1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO**

IbuTeva, 200 mg, tabletki powlekane

*Ibuprofenum*

**2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**

[logo Teva]

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

**3. TERMIN WAŻNOŚCI**

EXP:

**4. NUMER SERII**

Lot:

**5. INNE**