

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH**ETYKIETA NA POJEMNIK Z HDPE****1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO**

IbuTeva Max, 400 mg, tabletki powlekane
Ibuprofenum

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

Każda tabletki powlekana zawiera 400 mg ibuprofenu.

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH**4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA**

50 tabletek powlekanych

Kod

5 9 0 9 9 9 1 0 8 7 9 6 8

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.
Podanie doustne.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE**8. TERMIN WAŻNOŚCI**

Termin ważności (EXP):

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA**10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE**

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa
[logo]

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie Nr 15887

13. NUMER SERII

Nr serii (Lot):

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC - Lek wydawany bez recepty.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

- ból głowy
- migrenowy ból głowy
- ból zębów
- bolesne miesiączkowanie
- gorączka
-

<W przypadku braku opakowania zewnętrznego:

Tutaj otworzyć.

Informacja dotycząca stosowania leku, dawkowania i przeciwwskazań jest pod spodem etykiety w ulotce dla pacjenta.>

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE'A

IbuTeva Max

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Nie dotyczy

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

Nie dotyczy

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH**PUDEŁKO TEKSTUROWE NA POJEMNIK****1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO**

IbuTeva Max, 400 mg, tabletki powlekane
Ibuprofenum

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

Każda tabletki powlekana zawiera 400 mg ibuprofenu.

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH**4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA**

50 tabletek powlekanych

Kod

5	9	0	9	9	9	1	0	8	7	9	6	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.
Podanie doustne.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE**8. TERMIN WAŻNOŚCI**

Termin ważności (EXP):

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA**10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE**

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa
[logo]

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 15887

13. NUMER SERII

Nr serii (Lot):

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC - Lek wydawany bez recepty.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

- ból głowy
- migrenowy ból głowy
- ból zębów
- bolesne miesiączkowanie
- gorączka

Do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat:

Ból łagodny do umiarkowanego i gorączka:

½ do 1 tabletki podawane w pojedynczej dawce lub 3 do 4 razy na dobę co 4 do 6 godzin.

Maksymalna dawka dobową: 3 tabletki (1200 mg).

Migrenowy ból głowy:

1 tabletkę podawana w pojedynczej dawce lub jeśli konieczne 1 tabletkę, co 4 do 6 godzin.

Maksymalna dawka dobową: 3 tabletki (1200 mg).

Bolesne miesiączkowanie:

½ do 1 tabletki, 1 do 3 razy na dobę jeśli konieczne, co 4 do 6 godzin.

Maksymalna dawka dobową: 3 tabletki (1200 mg).

Tabletkę należy popić szklanką wody. Tabletkę należy przyjmować z posiłkiem i nie na pusty żołądek.

Lek **NIE jest** przeznaczony dla dzieci w wieku poniżej 12 lat.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, kiedy **NIE** przyjmować tego leku i kiedy zachować szczególną ostrożność, należy przeczytać ulotkę.

Tylko do krótkotrwałego stosowania: nie dłużej niż 7 dni u dorosłych i 3 dni u młodzieży bez porady lekarza. Należy zgłosić się do lekarza, jeśli objawy utrzymują się lub się nasilają.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE'A

IbuTeva Max

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Nie dotyczy

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

Nie dotyczy

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH**PUDEŁKO TEKSTUROWE NA BLISTRY****1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO**

IbuTeva Max, 400 mg, tabletki powlekane
Ibuprofenum

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

Każda tabletki powlekana zawiera 400 mg ibuprofenu.

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH**4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA**

6 tabletek powlekanych	Kod	5	9	0	9	9	9	0	7	2	6	0	6	6
12 tabletek powlekanych	Kod	5	9	0	9	9	9	0	7	2	6	0	7	3
24 tabletki powlekane	Kod	5	9	0	9	9	9	0	7	2	6	0	8	0

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.
Podanie doustne.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE**8. TERMIN WAŻNOŚCI**

Termin ważności (EXP):

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA**10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE**

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa
[logo]

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 15887

13. NUMER SERII

Nr serii (Lot):

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC - Lek wydawany bez recepty.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

- ból głowy
- migrenowy ból głowy
- ból zębów
- bolesne miesiączkowanie
- gorączka

Do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat:

Ból łagodny do umiarkowanego i gorączka:

½ do 1 tabletki podawane w pojedynczej dawce lub 3 do 4 razy na dobę co 4 do 6 godzin.
Maksymalna dawka dobową: 3 tabletki (1200 mg).

Migrenowy ból głowy:

1 tabletkę podawana w pojedynczej dawce lub jeśli konieczne 1 tabletkę, co 4 do 6 godzin.
Maksymalna dawka dobową: 3 tabletki (1200 mg).

Bolesne miesiączkowanie:

½ do 1 tabletki, 1 do 3 razy na dobę jeśli konieczne co 4 do 6 godzin.
Maksymalna dawka dobową: 3 tabletki (1200 mg).

Tabletkę należy popić szklanką wody. Tabletkę należy przyjmować z posiłkiem i nie na pusty żołądek.

Lek **NIE jest** przeznaczony dla dzieci w wieku poniżej 12 lat.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, kiedy **NIE** przyjmować tego leku i kiedy zachować szczególną ostrożność, należy przeczytać ulotkę.

Tylko do krótkotrwałego stosowania: nie dłużej niż 7 dni u dorosłych i 3 dni u młodzieży bez porady lekarza. Należy zgłosić się do lekarza, jeśli objawy utrzymują się lub się nasilają.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE'A

IbuTeva Max

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Nie dotyczy

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

Nie dotyczy

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH

BLISTER

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

IbuTeva Max, 400 mg, tabletki powlekane
Ibuprofenum

2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

[logo]
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

3. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP:

4. NUMER SERII

Lot:

5. INNE