

Pudełko tekturowe

Ibuxal Forte Dla Dzieci
40 mg/mL
zawiesina doustna

Ibuprofenum

1 mL zawiesiny doustnej zawiera 40 mg ibuprofenu.

Zawiera: sorbitol 70% (E 420), glikol propylenowy, sodu benzoatan (E 211).
W celu uzyskania dodatkowych informacji należy zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania.

Zawiesina doustna

100 mL kod

200 mL kod

Podanie doustne. Przed użyciem wstrząsnąć.
Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie zawiera cukru

Termin ważności (EXP):
Okres ważności po pierwszym otwarciu butelki: 3 miesiące.

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE**11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**

Biofarm Sp. z o.o.
ul. Wałbrzyska 13
60-198 Poznań

Biofarm (logo)

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr:

13. NUMER SERII

Nr serii (Lot):

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC - Lek wydawany bez recepty.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Od 3. miesiąca życia

lek o działaniu:

- przeciwbólowym
- przeciwgorączkowym
- przeciwzapalnym

O smaku pomarańczowym

Wiek/masa ciała dziecka	Dawkowanie	Częstość podawania
3 - 6 miesięcy (powyżej 5 kg)	1,25 mL (50 mg)	3 razy na dobę
6 – 12 miesięcy (7 - 9 kg)	1,25 mL (50 mg)	3-4 razy na dobę
1 - 3 lat (10 – 15 kg)	2,5 mL (100 mg)	3 razy na dobę
4 – 6 lat (16 – 20 kg)	3,75 mL (150 mg)	3 razy na dobę
7 – 9 lat (21 – 29 kg)	5 mL (200 mg)	3 razy na dobę
10 – 12 lat (30 – 40 kg)	7,5 mL (300 mg)	3 razy na dobę
Powyżej 12 lat (powyżej 40 kg)	7,5 mL (300 mg)	3-4 razy na dobę

Lek należy podawać w odstępach co najmniej 6 godzinnych.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

Ibuxal Forte Dla Dzieci

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D
--

<Nie dotyczy.>

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

<Nie dotyczy.>

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH

Etykieta na butelkę

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Ibuxal Forte Dla Dzieci
40 mg/mL
zawiesina doustna

Ibuprofenum

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

1 mL zawiesiny doustnej zawiera 40 mg ibuprofenu.

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Lek zawiera sorbitol 70% (E 420), glikol propylenowy i sodu benzoesan (E 211).
Dodatkowe informacje – patrz ulotka.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Zawiesina doustna

100 mL
200 mL

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Podanie doustne.
Przed użyciem wstrząsnąć.
Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP:

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.
Okres ważności po pierwszym otwarciu butelki: 3 miesiące.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE**11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**

Biofarm Sp. z o.o.
ul. Wałbrzyska 13
60-198 Poznań

Biofarm 

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr:

13. NUMER SERII

Lot:

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI**15. INSTRUKCJA UŻYCIA**

O smaku pomarańczowym

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A**17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D**

<Nie dotyczy.>

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

<Nie dotyczy.>