

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

PUDEŁKO TEKTUROWE

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Ibuxal Plus, 200 mg + 500 mg, tabletki powlekane

Ibuprofenum + Paracetamolum

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Każda tabletką zawiera 200 mg ibuprofenu i 500 mg paracetamolu.

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Dalsze informacje, patrz ulotka dołączona do opakowania.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Tabletki powlekane

10 tabletek powlekanych Kod 5310001258825

20 tabletek powlekanych Kod 5310001258658

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

PODWÓJNE DZIAŁANIE

ŁAGODZENIE BÓLU

Zawiera paracetamol.

Przyjmując ten lek, nie należy stosować innych leków zawierających paracetamol.

Nie należy przyjmować większych dawek leku niż podano w ulotce.

W razie przyjęcia zbyt dużej dawki leku należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli pacjent czuje się dobrze.

Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub wystąpią nowe objawy, należy skontaktować się z lekarzem.

8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności (EXP)

9. SPECJALNE WARUNKI PRZECHOWYWANIA

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Biofarm Sp. z o.o.
ul. Wałbrzyska 13
60-198 Poznań

Biofarm 

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 26257

13. NUMER SERII

Nr serii (Lot)

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC – Lek wydawany bez recepty

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Do krótkotrwałego leczenia łagodnego do umiarkowanego bólu spowodowanego migreną, bólu głowy, bólu pleców, bólów menstruacyjnych, bólu zęba, bólu mięśni, leczeniu objawów przeziębienia oraz grypy, bólu gardła i gorączki.

Dorośli:

Jedna do dwóch tabletek przyjmowane co 6 godzin, w razie potrzeby, maksymalnie do 6 tabletek na dobę. Tabletkę należy przyjmować w trakcie posiłku lub popijając wodą.

Nie należy przyjmować tego leku dłużej niż przez 3 dni.

Dzieci w wieku poniżej 18 lat:

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 18 lat.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE'A

ibuxal plus 200 mg + 500 mg

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Nie dotyczy.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

Nie dotyczy.

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH

BLISTER

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Ibuxal Plus, 200 mg + 500 mg, tabletki powlekane

Ibuprofenum + Paracetamolum

2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Biofarm (logo)

3. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP

4. NUMER SERII

Lot

5. INNE