

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

PUDEŁKO TEKTUROWE

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Inovox Express Active smak miodowo-cytrynowy,
1,2 mg + 0,6 mg, pastylki twarde,
Alkohol 2,4-dichlorobenzylowy + Amylometakrezol

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Każda pastylka twarda zawiera 1,2 mg alkoholu 2,4-dichlorobenzylowego i 0,6 mg amylometakrezolu.

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Substancje pomocnicze: olejek eteryczny miętowy, żółcień chinolinowa (E 104), sacharyna sodowa (E 954), kwas winowy (E 334), izomalt (E 953), maltitol ciekły (E 965), żółcień pomarańczowa (E 110), aromat cytrynowy (olejek cytrynowy, terpeny, naturalny cytral), aromat miodowy (w tym 1,2-Propanediol, kwas benzenooctowy, inne).

Dalsze informacje - patrz ulotka.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Pastylki twarde

8 pastylek Kod: 5903031285918

12 pastylek Kod: 5903031285925

24 pastylki Kod: 5903031285932

48 pastylek Kod: 5903031285949

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Podanie na śluzówkę jamy ustnej.
Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE**8. TERMIN WAŻNOŚCI**

Termin ważności (EXP):

9. SPECJALNE WARUNKI PRZECHOWYWANIA**10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE****11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO****Podmiot odpowiedzialny:**

US Pharmacia Sp. z o.o.,
ul. Ziębicka 40,
50-507 Wrocław
{tel.} 22 543 60 00
{logotyp podmiotu odpowiedzialnego}

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr

13. NUMER SERII

Nr serii (Lot):

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC - Lek wydawany bez recepty.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Lek na ból gardła

Do stosowania w objawowym leczeniu stanów zapalnych jamy ustnej i gardła.

Działanie:

- przeciwwirusowe
- przeciwbakteryjne

w stanach zapalnych jamy ustnej i gardła u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 6 lat.

Ssanie pastylki powoduje uwalnianie substancji czynnych, dzięki czemu następuje złagodzenie bólu gardła.

Dawkowanie:

Dorośli: w razie potrzeby jedna pastylka co 2 – 3 godziny, maksymalnie 8 pastylek w ciągu 24 godzin.
Dzieci w wieku powyżej 6 lat: jedna pastylka co minimum 2 godziny, maksymalnie 4 pastylki w ciągu 24 godzin.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

inovox express active smak miodowo-cytrynowy

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D
--

Nie dotyczy.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

Nie dotyczy.

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH

BLISTER

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Inovox Express Active smak miodowo-cytrynowy,
1,2 mg + 0,6 mg, pastylki twarde
Alkohol 2,4-dichlorobenzylowy + Amylometakrezol

2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

US Pharmacia Sp. z o.o.

3. TERMIN WAŻNOŚCI

{słowo EXP wraz z ciągiem cyfr określających termin ważności zostanie wytłoczone lub nadrukowane}

4. NUMER SERII

{słowo Lot wraz z ciągiem znaków określających numer serii zostanie wytłoczone lub nadrukowane}

5. INNE