

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

Pudełko tekturowe

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Ambrosol Teva
15 mg/5 ml, syrop
Ambroxoli hydrochloridum

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

Skład: 5 ml syropu (1 łyżka miarowa) zawiera 15 mg ambroksolu chlorowodoru

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

oraz substancje pomocnicze: sorbitol płynny 70% (E420), glicerol (E422), glikol propylenowy (E1520), metylu parahydroksybenzoesan (E218), propylu parahydroksybenzoesan (E216) i inne.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Syrop

120 ml Kod: 5909990345410

200 ml Kod: 5909990086603

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Podanie doustne.
Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności:

Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania: 28 dni.

9. SPECJALNE WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić od światła.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Podmiot odpowiedzialny:
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o. o.
ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa
(logo podmiotu odpowiedzialnego)

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: R/3454

13. NUMER SERII

Nr serii:

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC - Lek wydawany bez recepty.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Lek wykrztuśny

Pacjent nie powinien stosować produktu leczniczego dłużej niż 4 do 5 dni bez konsultacji z lekarzem.
Nie należy zażywać leku bezpośrednio przed snem.

- Zapalenie oskrzeli
- Ułatwia odkrztuszanie
- Łagodzi kaszel

Sposób stosowania:

| Wiek | Dawka | Częstość stosowania |
|---|---|---------------------|
| Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat | Początkowo przez 2 do 3 dni: 10 ml syropu (2 łyżki miarowe) | 3 razy na dobę |
| | Kontynuacja leczenia: 10 ml syropu (2 łyżki miarowe) | 2 razy na dobę |
| Dzieci w wieku od 6 lat do 12 lat | 5 ml syropu (1 łyżka miarowa) | 2 do 3 razy na dobę |
| Dzieci w wieku od 2 lat do 6 lat | 2,5 ml syropu (½ łyżki miarowej) | 3 razy na dobę |

Szczegółowe informacje, patrz ulotka dla pacjenta.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

ambrosol teva 15 mg w 5 ml

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Nie dotyczy

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

Nie dotyczy