

**INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH**  
**TEKTUROWE PUDEŁKO**

**1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO**

Ambroxol Rivopharm, 15 mg/5 ml, roztwór doustny

*Ambroxoli hydrochloridum*

**2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ**

Jeden ml roztworu doustnego zawiera 3 mg ambroksolu chlorowodoru.

**3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH**

Zawiera sorbitol (E420). Dodatkowe informacje – patrz ulotka.

Zawiera aromat truskawkowy.

**4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA**

Roztwór doustny

100 ml

Kod EAN:

5	9	0	9	9	9	1	2	3	6	4	9	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Do opakowania dołączona jest strzykawka doustna.

**5. SPOSÓB I DROGA PODANIA**

Podanie doustne

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

**6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI**

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

**7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE**

**8. TERMIN WAŻNOŚCI**

Termin ważności:

Po pierwszym otwarciu użyć w ciągu 6 miesięcy.

**9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA**

**10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE**

**11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**

[logo Actavis]  
Actavis Group PTC ehf.  
Reykjavíkurvegi 76-78  
220 Hafnarfjörður  
Islandia

**12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU**

Pozwolenie nr: 22670

**13. NUMER SERII**

Nr serii:

**14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI**

OTC - Lek wydawany bez recepty.

**15. INSTRUKCJA UŻYCIA**

Leczenie mokrego kaszlu u dzieci od 6 do 12 lat. Rozrzedza wydzielinę, zmniejszając jej gęstość, ułatwia jej odkrztuszenie.

Dzieci od 6 do 12 lat

Przyjmować 5 ml roztworu doustnego dwa do trzech razy dziennie.

Nie stosować dłużej niż 4-5 dni bez konsultacji z lekarzem. Jeśli po upływie 5 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Nie stosować, jeśli pacjent ma uczulenie na ambroksolu chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

**Leku Ambroxol Rivopharm nie wolno stosować u dzieci poniżej 6 lat.**

< Na mokry kaszel  
Od 6 do 12 lat >

**16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A**

ambroxol rivopharm

**MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA OPAKOWANIACH  
BEZPOŚREDNICH**

**ETYKIETA NA BUTELKĘ**

**1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO**

Ambroxol Rivopharm, 15 mg/5 ml, roztwór doustny

*Ambroxoli hydrochloridum*

**2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ**

Jeden ml roztworu doustnego zawiera 3 mg ambroksolu chlorowodoru.

**3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH**

Zawiera sorbitol (E420). Dodatkowe informacje – patrz ulotka.

**4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA**

100 ml roztwór doustny

**5. SPOSÓB I DROGA PODANIA**

Podanie doustne

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

**6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO  
W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI**

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

**7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE**

**8. TERMIN WAŻNOŚCI**

Termin ważności:

Po pierwszym otwarciu użyć w ciągu 6 miesięcy.

**9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA**

**10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE**

**11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**

[logo Actavis]  
Actavis Group PTC ehf.  
Reykjavíkurvegi 76-78  
220 Hafnarfjörður  
Islandia

**12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU**

Pozwolenie nr: 22670

**13. NUMER SERII**

Numer serii:

**14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI**

**15. INSTRUKCJA UŻYCIA**

Leczenie mokrego kaszlu u dzieci od 6 do 12 lat.

Dzieci od 6 do 12 lat

Przyjmować 5 ml roztworu doustnego dwa do trzech razy dziennie.

Nie stosować dłużej niż 4-5 dni bez konsultacji z lekarzem. Jeśli po upływie 5 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Nie stosować, jeśli pacjent ma uczulenie na ambroksolu chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

**Leku Ambroxol Rivopharm nie wolno stosować u dzieci poniżej 6 lat.**

**16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE'A**