

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH
TEKTUROWE PUDEŁKO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Ambroxol Rivopharm 30 mg/5 ml, roztwór doustny

Ambroxoli hydrochloridum

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

Jeden ml roztworu doustnego zawiera 6 mg ambroksolu chlorowodoru.

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Zawiera sorbitol (E420). Dodatkowe informacje – patrz ulotka.

Zawiera aromat truskawkowy.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Roztwór doustny

100 ml

Kod EAN:

5	9	0	9	9	9	1	2	3	6	5	0	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Do opakowania dołączona jest strzykawka doustna.

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Podanie doustne

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności:

Po pierwszym otwarciu użyć w ciągu 6 miesięcy.

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

[logo Actavis]
Actavis Group PTC ehf.
Reykjavíkurvegi 76-78
220 Hafnarfjörður
Islandia

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: 22671

13. NUMER SERII

Nr serii:

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC - Lek wydawany bez recepty.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Leczenie mokrego kaszlu u dorosłych i młodzieży powyżej 12 lat. Rozrzedza wydzielinę, zmniejszając jej gęstość, ułatwia jej odkrztuszenie.

Dorośli i młodzież powyżej 12 roku życia

Przez pierwsze 2-3 dni: przyjmować 5 ml roztworu doustnego 3 razy dziennie.

Następnie przyjmować 5 ml roztworu doustnego dwa razy dziennie.

U dorosłych dawkę można zwiększyć do 10 ml dwa razy dziennie, jeśli to konieczne.

Nie stosować dłużej niż 4-5 dni bez konsultacji z lekarzem. Jeśli po upływie 5 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Nie stosować, jeśli pacjent ma uczulenie na ambroksolu chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Leku Ambroxol Rivopharm nie wolno stosować u dzieci poniżej 6 lat.

< Na mokry kaszel
Powyżej 12 lat >

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE' A

ambroxol rivopharm

**MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA OPAKOWANIACH
BEZPOŚREDNICH**

ETYKIETA NA BUTELKĘ

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Ambroxol Rivopharm , 30 mg/5 ml, roztwór doustny

Ambroxoli hydrochloridum

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

Jeden ml roztworu doustnego zawiera 6 mg ambroksolu chlorowodoru.

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Zawiera sorbitol (E420). Dodatkowe informacje – patrz ulotka.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

100 ml roztwór doustny

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Podanie doustne

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

**6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO
W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI**

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności:

Po pierwszym otwarciu użyć w ciągu 6 miesięcy.

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

[logo Actavis]
Actavis Group PTC ehf.
Reykjavíkurvegi 76-78
220 Hafnarfjörður
Islandia

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: 22671

13. NUMER SERII

Numer serii:

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Leczenie mokrego kaszlu u dorosłych i młodzieży powyżej 12 lat.

Dorośli i młodzież powyżej 12 lat

Przez pierwsze 2-3 dni: przyjmować 5 ml roztworu doustnego 3 razy dziennie.

Następnie przyjmować 5 ml roztworu doustnego dwa razy dziennie.

U dorosłych dawkę można zwiększyć do 10 ml dwa razy dziennie jeśli to konieczne.

Nie stosować dłużej niż 4-5 dni bez konsultacji z lekarzem. Jeśli po upływie 5 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Nie stosować, jeśli pacjent ma uczulenie na ambroksolu chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Leku Ambroxol Rivopharm nie wolno stosować u dzieci poniżej 6 lat.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE'A